

## SYMPTOMER EFTER BELKAR I VINTERRAPS

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug

I enkelte marker ses deformede planter som følge af for tidlig anvendelse/for høj dosis af ukrudtsmidlet Belkar i efteråret.

De seneste dage er modtaget enkelte henvendelser om skader af ukrudtsmidlet Belkar (halauxifen + picloram) i vinterraps. Se fotos. Der er tale om deformiteter, som skyldes en hormonvirkning af Belkar. Firmaet oplyser, at det enten skyldes for tidlig anvendelse eller for høj dosis i relation til rapsens vækststadium. I markerne vil typisk både være både små og store planter på sprøjtetidspunktet. På brugsanvisningen står, at Belkar må anvendes i vækststadium 12-15 med 0,25 eller i vækststadium 16-30 med 0,5 l.





Billede 1. Skade forårsaget af ukrudtsmidlet Belkar. Foto: Anders Pontoppidan Møller.



Billede 2. Skade forårsaget af ukrudtsmidlet Belkar. Foto: Anders Pontoppidan Møller.



Billede 3. Skade forårsaget af ukrudtsmidlet Belkar. Foto: Anders Pontoppidan Møller.



Billede 4. Skade forårsaget af ukrudtsmidlet Belkar. Foto: Anders Pontoppidan Møller.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.