



SVAMPE- OG SKADEDYRSBEKÆMPELSE I BYG-, ÆRTE- OG BYG/ÆRTEHELSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador 250 SC godkendt.

BYGHELSÆD

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byghelsæd kan være nødvendig ved mere udbredte angreb. De samme vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme og skadedyr i korn til modenhed kan anvendes i byghelsæd. Se "[Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn](#)" og "[Bekæmpelsestærskler for skadedyr i korn](#)". Se også svampemidlernes effekt i tabel 1. i "[Svampemidler i korn](#)".

Ved bekæmpelse af svampe og skadedyr i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. En oversigt over sprøjtefrister i vårbyg ses i tabel 1. Både krav til vækststadie og antal dage skal være opfyldt.

Tabel 1. Oversigt over sprøjtefrister for svampe - og skadedyrsmidler i vårbyg.

Svampemiddel	Sprøjtefrist i vårbyg	
Amistar/Mirador 250 SC	35	69
Approach (Produktet er afmeldt, og sidste lovlige anvendelse er 1. december 2018)	35	47
Bell	35	65

Bumper 25 EC	-	65
Ceando	35	65
Comet Pro	42	-
Flexity	35	59
Folicur Xpert	-	61
Folpan 500 SC	-	59
Input EC 460	35	61
Juventus 90	35	65
Mirador Forte	35	59
Opera	-	65
Orius 200 EW	-	69
Proline EC 250	35	65
Proline Xpert	-	61
Propulse SE 250	-	61
Prosaro 250 EC	35	61
Rubric/Maredo 125 SC	35 (Maredo)	65
Talius	-	49
Viverda/ Viverda Ezi	-	65
Skadedyrsmidler	Sprøjtefrist	
Fastac 50	42 dage (Hvis udlæg af lucerne, græs og kl. græs, så 14 dage før høst af grønkorn. 28 dage før høst af helsæd)	-
Kaiso Sorbie	28	-
Karate 2,5 WG	30	65
Mavrik Vita	30	75
Pirimor G	30	75

I tabel 2 ses nogle af de mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme.

Tabel 2. De mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme (www.sortInfo.dk)

Sort	Brutto- merudb. svampe- sprøjt-ning 12 fs. 2015-17	Meldug (-1-3)•	Bygbladplet (0-3)•	Bygrust (0-3)•	Skoldplet (0-3)•	Ramularia (0-3)•
RGT Planet	7,5	-1 ¹⁾	2	3	2	2

KWS Irina	6,5	-1	1	3	2	2
Evergreen	4,7	-1 ¹⁾	2	2	2	2
Laurikka	7,9	-1 ¹⁾	3	3	1	3
Flair	6,2	-1 ¹⁾	0	3	2	3
Crossway	6,7	-1 ¹⁾	3	3	1	3
KWS Cantton	4,9	-1 ¹⁾	2	3	2	2
Laureate	7,4	0	0	2	1	2
Dragoon	6,5	-1 ¹⁾	1	2	2	2

0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig og 3 er meget modtagelig. -1= mlo-resistens mod meldug.

1) Egenskab for mlo-resistens er oplyst af forædlerne.

BYG/ÆRTEHELSÆD

Kun svampemidlet Amistar/Mirador 250 SC er godkendt til brug i både korn og ærter. Sprøjtefristen er 35 dage før høst (st. 69). Amistar/Mirador 250SC har god effekt mod bygrust og nogen effekt mod bygbladplet, men har kun meget begrænset effekt mod meldug og skoldplet.

Alle skadedyrsmidler, der er godkendt i ærter (se nedenfor), er også godkendt i byg.

ÆRTEHELSÆD

Svampebekæmpelse anbefales generelt ikke i ærtehelssæd.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælg længde over 50 procent angrebne planter.

Sprøjtefristen for Pirimor G er 3 dage, (st. 88). Mavrik Vita (st. 79), Fastac 50 og Karate 2,5 WG (st. 69) har en sprøjtefrist på 7 dage.