



1. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER DEN 27.-28. AUGUST

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De første registreringer er foretaget, og der er pt. ikke bekæmpelsesbehov rettet mod larver. Hold dog øje med evt. bladgnav.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 70 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. I år er rapsen ubejdset mod skadedyr, så man skal være ekstra opmærksom på evt. bladgnav.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Der er pt. Kun registranter meget få rapsjordlopper i fangbakkerne.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Se [data og uddybende kommentarer](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.