

6. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER DEN 1.-2. OKTOBER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Pt. er tærsklen for bekæmpelse af larver overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.


Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Bekæmpelsestidspunktet er således meget fleksibelt.

0,2 kg/ha Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie kan anvendes til bekæmpelse rettet mod larver. Mavrik Vita har mindre god effekt og anbefales ikke.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.

Se [data og uddybende kommentarer](#).





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2013-2018. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).



Billede 1. Både rapsjordlopper og kålmøllarver kan gnave "vinduer" i rapsbladene, hvor de ikke æder helt igennem. I denne mark blev der fundet larver af kålmøl på bladene. Fotograferet 1. oktober af Carsten Mouritsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.