


Involverende processer i 3. Planperiode

Flemming Gertz, Irene Wiborg - SEGES

Susanne Mortensen, Niels Vedel, Torben Bramming – Limfjorden

Mette Lise Glinnerup - NIRAS





SEGES



Interreg
North Sea Region
WaterCoG
European Regional Development Fund




Tanker om forvaltningsprocesser



Forskellig grad af interaction mellem “bottom up” og “top down” i hvert forvaltnings step

Tanker om forvaltningsprocesser



Lokal baseret vandområdeplan:

Staten er "lead"

Med input undervejs fra aktører

Transparent proces

Lokal baseret indsatsplan:

Kommune "lead"

Med input undervejs fra aktører

Transparent proces

Ejerskab




Staten overordnet ansvarlig



KONCEPTIDÉ: LOKALT BASERET PLANPROCES FOR PRIORITERET VANDOMRÅDE,

WATER COG
3. PLANPERIODE
FORSØGSProjekt

Lokalt baseret indsatsplan?



Skive Fjord Pilot: Indsats i 2018, WaterCoG & SEGES promilleprojekt


Lokalt baseret basisanalyse/(vandplan):

- Data ud af databaser for Skive Fjord
- Involvering af brugere og teknikere
- Rapport om tilstand for Skive Fjord
- Aktivering af DHI model for Skive Fjord (?)
- Følsomhedsanalyser
- Involvering af brugere og teknikere
- Rapport
- Beskrivelse af opland (delvist lavet)
- Optimeret max tildeling af virkemidler
- Økonomisk følsomhedsanalyse
- Involvering af teknikere
- Rapport
- Minus: Søer, vandløb, grundvand, indsatsplaner


SEGES

KONCEPTIDÉ: LOKALT BASERET PLANPROCES FOR PRIORITERET VANDOMRÅDE,
- INDSATS FOR SKIVE FJORD

WATER COG
3. PLANPERIODE
FORSØGS-PROJEKT




Tilstand Skive Fjord




Figur 63 - st. 007. Månedsgennemsnit af tre 10-årige perioder og én 7-årig periode for klorofyl topprøver. Topprøver: dybde ≤ 1 m. Miljømålet er en god-moderat grænseværdi for sommerklorofyl fra maj-september på 6 $\mu\text{g/l}$ (Kaas et al., 2015?).

Tilstand Skive Fjord




gur 65 - st. 007. Månedsgennemsnit af 10-årige perioder for sigtdybde.

Tilstand Skive Fjord




Figur 68 - st. 007. Registreringer af iltsvind (<4,0 mg oxygen/L) og kraftigt iltsvind (<2,0 mg oxygen/L) i procent som forholdet mellem antal udsejlinger fra maj-oktober og antal prøver med iltsvind og kraftigt iltsvind (registrering af max 1. pr. udsejling) i samme periode.

Tilstand Skive Fjord




Figur 61 - st. 007. Månedsgennemsnit af tre 10-årige perioder og én 7-årig periode for Orthophosphat-P topprøver. Topprøver: dybde ≤ 1 m. Grænseværdien er sat til $6,2 \mu\text{g/l}$, og er en vejledende værdi for hvornår fosfor er begrænsende.

Tilstand Skive Fjord



Figur 53 - st. 007. Månedsgennemsnit af tre 10-årige perioder og én 7-årig periode for koncentrationen af uorganisk kvælstof, DIN (Dissolved inorganic nitrogen), for topprøver (dybde ≤ 1 m.). Ammoniak+ammonium-N + Nitrit+nitrat-N = DIN (µg/l). Grænseværdien er sat til 28 µg/l, og er en vejledende værdi for hvornår kvælstof er begrænsende.

Tilstand Skive Fjord



Figur 54 - st. 007. Månedsgennemsnit af tre 10-årige perioder og én 7-årig periode for koncentrationen af uorganisk kvælstof, DIN (Dissolved inorganic nitrogen), for bundprøver (dybde $\geq 3,5$ m.). Ammoniak+ammonium-N + Nitrit+nitrat-N = DIN ($\mu\text{g/l}$). Grænseværdien er sat til 28 $\mu\text{g/l}$, og er en vejledende værdi for hvornår kvælstof er begrænsende.

Statistisk model Skive Fjord - AU

