

Specifikation til DMS-29276 – Analyseudskrift ”Kvier – produktion”

Udskriftsheader

Driftsenhed	Valgte driftsenhed
Besætninger	Alle besætninger i driftsenheden (som øvrige analyseudskrifter)
Udskrevet	Dato for dannelselse af udskriften

GENERELLE KOMMENTARER

Måned og år: Dyr som har haft dage i et alderinterval f.eks. 1-14 dage de seneste 12 måneder. Dyret skal blot have haft en dag i perioden, hvor det var i dette aldersinterval 1-14 dage. Således vil et dyr, som er død på dag 2 tælle med, ligesom et dyr som er født næstsidste dag i perioden tæller med.

Nøgletal kan ses pr afsluttet 12 mdr. Desuden vises (hvis muligt) med stiplede søjle, resultatet for indeværende måned.

Tyrekvie/slagtekvie indgår ikke som kvier i analyseudskriften.

Udsætter kode(60): her tæller dyret med indtil det får en kode 60, hvis dyret genindsættes (kode 61), så tæller det med i hele perioden.

Periodeafgrænsning: Udskriften skal ikke kunne trækkes bagud i tid, men bare pr. dags dato.

Tal i nedenstående skitser af tabeller og grafer: Er delvist fiktive, så man kan ikke regne med at de hænger logisk sammen her, men indgår blot for at visualisere den skrevne kravspecifikation

Diagrammer: For alle søjlediagrammer gælder, at hvis der ikke er data, skal der skrives følgende tekst: Ingen registrerede behandlinger/hændelser de seneste 12 mdr.


Blok: Dødfødte og døde indenfor 24 timer

Dødfødte og døde indenfor 24 timer				Målsætning: 5%	
	Egen driftsenhed			Sammenligningsgruppe	
	Antal fødte	Antal kælvninger	Opnået, pct.	25% bedste	25% ringeste
Alle kælvninger	144	134	8,9	2,7	7,6
Efter 1. kalvs	43	42	11,6	3,7	9,8
Efter 2. kalvs	45	45	2,2	0	5,9
Efter 3+ kalvs	56	47	17,9	2,1	6,8

Tabel der viser følgende:

Målsætning	Målsætning "Dødfødte kalve" vises fra Målsætninger. Hvis der ikke er en målsætning står der "Mangler"
Antal fødte	Antal fødte (handyr, kvier og ukendt) pr. paritet
Antal kælvninger	Antal kælvninger pr. paritet
Dødfødte/døde %	Pct. dødfødte eller døde fordelt på bedriftsenhed, Alle køer, 1., 2. og 3+ kalvs vises for følgende: Egen driftsenhed 25 % bedste 25 % ringeste

Blok: Antal døde 1-60 dage og afgangsårsager




*For dyr med 2 afgangsårsager vises afgangsårsag 1 og derved svarer summen af de grå søjler til det totale antal døde.

Søjlediagram hvor Y-aksen viser antal dyr

Døde 1-60 dage	Antal døde kalve i alderen dag 1 – 60 vises som total i en søjle OG opdelt i afgangsårsagerne, der vises på hver sin søjle - Diarré (dyr med afgangsårsag Diarré) - Lungebetændelse (dyr med afgangsårsag Lungebetændelse) - Andre afg. årsager (alle andre afgangsårsager end Diarré eller Lungebetændelse summeres i denne kategori) - Dyr uden afg. årsag (Antal døde dag 1-60 minus antal døde med afgangsårsag vises i denne søjle) - *For dyr med 2 afgangsårsager vises afgangsårsag 1 og derved svarer summen af de grå søjler til det totale antal døde (Denne forklaring vises under figuren).
----------------	--

Blok: Diarré eller tarmbetændelse, 1 til 14 dage

Nøgletallet bruges som indikator i Kviebarometret




Tabel:

Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt på driftsenheden. Det er dyr 'at risk' – det vil sige dyr der indenfor de seneste 12 mdr. har været til stede mindst en dag i aldersintervallet 1-14 dage.
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr (%)	I procent angives kviekalve der har haft enten diarré eller tarmbetændelse (LK-koderne 120051,120028) inden for de første 14 dage af kviens levetid. Procentsatsen vises pr. måned for hver af følgende: - Egen driftsenhed (svarer til kolonnen syge dyr sidste 12 mdr fra sygdomsopgørelsen, når det beregnes som procent) - Bedste 25 % - Ringeste 25 % Vi følger HJN's beregningsprincip for nøgletallet. Det vil sige at et dyr kan bidrage én gang i nævneren og maks én gang i tælleren. Gælder på tværs af LK-koderne.

Diagram:

Kviekalve med diarré eller tarmbetændelse	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen + evt. indeværende mdr. – se generel beskrivelse øverst i dok.

Blok: Diarré eller tarmbetændelse 15 til 60 dage.




Tabel:

Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt på driftsenheden det vil sige dyr der indenfor de seneste 12 mdr har været til stede mindst en dag i aldersintervallet 15-60 dage.
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr (%)	I procent angives kviekalve der har haft enten diarré eller tarmbetændelse, (LK-koderne 120051,120028)i alderen 15 til 60 dage. Procentsatsen vises pr. måned for det seneste år for hver af følgende: - Egen driftsenhed - Bedste 25% - Ringeste 25% Hvis flere behandlinger på dyret i perioden, tæller dyret kun med én gang. Gælder på tværs af LK-koderne.

Diagram:

Kviekalve med diarré eller tarmbetændelse	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen + evt. indeværende mdr. Se generel beskrivelse øverst i dokumentet

Blok: Lunge- eller mellemørebetændelse, 1 til 60 dage
Nøgletal bruges som indikator i Kviebarometret




Tabel:

Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt på driftsenheden det vil sige dyr der indenfor de seneste 12 mdr har været til stede mindst en dag i aldersintervallet 1-60 dage.
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr (%)	I procent angives kviekalve der har haft enten lunge- eller mellemørebetændelse (LK-koderne 120041 og 120133) indenfor de første 60 dage af kviens levetid. Procentsatsen vises pr. måned for de seneste 12 måneder for hver af følgende: - Egen driftsenhed - Bedste 25 % - Ringeste 25% Hvis flere behandlinger på dyret i perioden, tæller dyret kun med én gang. Gælder på tværs af LK-koderne.

Diagram:

Kviekalve med lunge- eller mellemørebetændelse	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen + evt. indeværende mdr. Se generel beskrivelse øverst i dokumentet

Blok: Cryptosporidiose eller Coccidiose, 1 til 60 dage




Tabel:

Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt på driftsenheden det vil sige dyr der indenfor de seneste 12 mdr har været til stede mindst en dag i aldersintervallet 1-60 dage.
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr (%)	I procent angives kviekalve der har haft enten Cryptosporidiose eller Coccidiose (LK-koderne ? og ?) indenfor de første 60 dage af kviens levetid. Procentsatsen vises pr. måned for de seneste 12 måneder for hver af følgende: - Egen driftsenhed - Bedste 25 % - Ringeste 25% Hvis flere behandlinger på dyret i perioden, tæller dyret kun med én gang. Gælder på tværs af LK-koderne.

Diagram:

Kviekalve med Cryptosporidiose eller Coccidiose	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen + evt. indeværende mdr. Se generel beskrivelse øverst i dokumentet

Blok: Diarré, tarmbetændelse eller Coccidiose 61 til 180 dage



Tabel:


Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt på driftsenheden. Det vil sige dyr der indenfor de seneste 12 mdr. har været til stede mindst en dag i aldersintervallet 61-180 dage.
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr (%)	I procent angives kviekalve der har haft enten diarré, tarmbetændelse eller Coccidiose (LK-koderne 120051,120028 eller ?) i alderen 61 til 180 dage Procentsatsen vises pr. måned for det seneste år for hver af følgende: - Egen driftsenhed - Bedste 25 % - Ringeste 25% Hvis flere behandlinger på dyret i perioden, tæller dyret kun med én gang.

Diagram:

Kviekalve med diarré, tarmbetændelse, Coccidiose eller løbe-tarmorm	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen + evt. indeværende mdr. Se generel beskrivelse øverst i dokumentet

Blok: Lunge- og mellemørebetændelse, 61 til 180 dage

Nøgletal bruges som indikator i Kviebarometret



Tabel:

Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt i alderen 61-180 dage på driftsenheden i perioden
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr (%)	I procent angives kviekalve der har haft enten lunge- eller mellemørebetændelse (LK-koderne 120041 og 120133) i alderen 61 til 180 dage. Procentsatsen vises pr. måned for de seneste 12 måneder for hver af følgende: - Egen driftsenhed - Bedste 25 % - Ringeste 25 % Hvis flere behandlinger på dyret i perioden, tæller dyret kun med én gang. Dette gælder på tværs af LK-koderne.

Diagram:

Kviekalve med lunge- eller mellemørebetændelse	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen Se generel beskrivelse øverst i dokumentet

Blok: Alder ved 1. inseminering

Alder ved 1. inseminering					
Kvier (antal)	Driftsenheds-gennemsnit		Spredningen på driftsenhedsgns.		
	Mål	Opnået	Egen driftsenhed	Bedste 25%	Ringeste 25%
Alder i mdr. (187)	15,0	15,4	1,2	0,8	1,4

OBS! Denne blok findes stort set identisk på en eksisterende udskrift (Reproudskrift, kvier) – eneste forskel er at kolonnen 'Mål' ikke indgår i Reproudskrift, kvier

Antal kvier med opnået løbe-status i perioden	Her vises antal dyr i aktuelle driftsenhed Kvier der har opnået løbealder (14. mdr. stor race og 12 mdr. Jersey i perioden dags dato minus 60 dage og 12 mdr. bagud som på Reproudskrift kvier – dvs. at antallet kan hentes samme sted, som udskriften i DMS)
Driftsenheds-gennemsnit	Her vises for aktuelle driftsenhed: - Mål (Mål for alder ved 1. ins. aflæses fra Grundoplysninger og mål og vises i mdr. med 1 decimal) - Opnået (findes i DWH - Gennemsnitlig alder ved 1. inseminering for kvier, i perioden. Vises i mdr. med 1 decimal.)
Spredning på driftsenhedsgennemsnit	Spredning (alder i mdr. med 1 decimal) (findes i DWH) vises for: - Egen driftsenhed - Opnået - Bedste 25% - Ringeste 25%

Blok: Kvier med mere end 3 insemineringer

Nøgletal bruges også som indikator i Kviebarometret

Insemineringer pr. dyr ≥ 3			
Kvier (antal)	Egen driftsenhed	Sammenligningsgruppe	
	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
Dyr med 3 eller flere insemineringer, % (154)	8,1	3,2	12,8

Kvier (antal)	Titel-felt; men parentes betyder at der skal optælles: antal dyr i den aktuelle driftsenhed, som har haft en inseminering indenfor de seneste 12 mdr fra dags dato, og tallet vises så i række 2 i parentes.
---------------	---

Dyr med 3 eller flere insemineringer, % (antal)	Tæller: Der tælles op hvor mange kvier der har opnået den 3. eller flere insemineringer indenfor de seneste 12 mdr. Alle forudgående insemineringer også udenfor perioden indgår i optællingen af antallet af insemineringer for den enkelte kvie. Nævner: antallet af kvier som er blevet insemineret indenfor de seneste 12 mdr. Insemineringer defineres, som i ny grundlagstabel, som Lars Sindberg har lavet: inseminering, ilægning eller hvis løbestart=løbeslut tæller som en inseminering. Hvis geninseminering <8 dage efter en inseminering da tæller geninsemineringen ikke. Procent kvier med 3 eller flere insemineringer angives for følgende: Egen driftsenhed Bedste 25% Ringeste 25%
---	---

Blok: Alder ved 1. kælvning

Nøgletal Alder ved 1. kælvning, std. bruges som indikator i Kviebarometret

Alder ved 1. kælvning					
Kvier (antal)	Driftsenheds-gennemsnit		Spredningen på driftsenhedsgns.		
	Mål	Opnået	Egen driftsenhed	Bedste 25%	Ringeste 25%
Alder i mdr. (134)	23,5	24,5	1,3	1,5	2,4

Nøgletallene eksisterer i Nøgletalstjek

Antal dyr i driftsenheden	Her vises antal dyr i aktuelle driftsenhed. Tallet eksisterer i Nøgletalstjek bag beregningen af "Alder ved 1. kælvning". Det er Lars Sindberg der har lavet en grundlagstabel!
Driftsenheds-gennemsnit	Her vises for den aktuelle driftsenhed: - Mål Mål for alder ved 1. kælvning aflæses fra Grundoplysninger og mål og vises i mdr. med 1 decimal - Opnået Gennemsnitlig alder for kviekælvninger, hvor der er registreret en kælvning i perioden. Viser i mdr. med 1 decimal.
Spredning på driftsenhedsgennemsnit	Spredning (alder i mdr. med 1 decimal) vises for: - Egen driftsenhed - Bedste 25% - Ringeste 25%

Blok: Foderdage pr. produceret kvie, antal

OBS: Tal findes ikke før JNl's beregninger er sat i produktion

Foderdage pr. produceret kvie (kælvede + tabte kvier)					
Kvier (antal dyr i perioden*)	Egen driftsenhed		Foderdage hos tabte kvier, mdr.		
	Mål	Opnået	Egen driftsenhed	Bedste 25%	Ringeste 25%
Foderdage pr. produceret kvie, mdr. (175)	26,0	29,3	6,3	1,5	4,2

OBS! TINE SPRING NEDENSTÅENDE ELEMENT OVER I FØRSTE OMGANG

Afklar med Jørgen... Foderdage skal være pr. kælvet kvie i besætningen. Hvordan er det helt nøjagtigt at beregningen fungerer?

OBS: Mangler lidt forklaring/dokumentation om hvordan det er udregnet. Kan disse tal køres uden at køre hele holdbarhedsdelen? Vende med JNl! Hvor mange dyr skal med?

Antal dyr i perioden	Jørgens beregning skal bruges, og vi skal sikre os at der er sammenhæng i forhold til de dyr der indgår i beregning af Alder ved 1. kælvning. Usikkert om denne skal med, det afhænger af beregningen. Afklares med JNl
Gennemsnit, driftsenhed	Her vises for aktuelle driftsenhed: - Mål Mål for antal foderdage pr. produceret kvie kan kun aflæses hvis der oprettes en målsætning i Grundoplysninger og mål og vises i mdr. med 1 decimal - Opnået Gennemsnit for foderdage pr. produceret kvie = gennemsnitlig alder ved 1. kælvning + gennemsnit for foderdage hos tabte kvier. Viser i mdr. med 1 decimal.
Spredning på driftsenhedsgennemsnit	Spredning (alder i mdr. med 1 decimal) vises for: - Egen driftsenhed - Bedste 25% - Ringeste 25%

Blok: Løbe / tarm-orm dag 1 - kælvning

Løbe / tarm-orm dag 1 - kælvning					
Kvier	Egen driftsenhed			Sammenligningsgruppe	
	Antal	Mål	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
1.gangsbehandlede dyr, %	273	1,8	2,1	0,7	4,1

Tabel:

Kviekalve (antal)	Antal kvier i alt på driftsenheden det vil sige dyr der indenfor de seneste 12 mdr har været til stede mindst en dag i aldersintervallet dag 1 til kælvning dage.
Mål, egen driftsenhed	Målsætning skal oprettes i målsætningsmodul
1.gangsbehandlede dyr, %	I procent angives kviekalve der har haft løbe / tarm-orm (LK-koderne ?) indenfor levende dag 1 til kælvning. Procentsatsen vises pr. måned for de seneste 12 måneder for hver af følgende: - Egen driftsenhed - Bedste 25 % - Ringeste 25% Hvis flere behandlinger på dyret i perioden, tæller dyret kun med én gang. Gælder på tværs af LK-koderne.

Diagram:

Kviekalve med løbe / tarm-orm	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen + evt. indeværende mdr. Se generel beskrivelse øverst i dokumentet


Blok: Omsætning af kvier

Omsætning af kvier				
Periode	Køb	Solgt levebrug	Slagtning	Død/aflivet
Seneste 3 mdr	3	0	2	5
Seneste 12 mdr	4	8	12	17

Tabel:

Seneste 3 mdr. Seneste 12 mdr.	Antallet af kvier der er hhv. købt ind i den tværfaglige driftsenhed, solgt til levebrug, slagtet eller død/aflivet oplyses i de respektive kolonner. Farvemarkeringen af kolonnerne 'slagtet' og 'død/aflivet' skal være i overensstemmelse med de farver der fremgår af figuren nedenfor. Desuden må der ikke anvendes grøn og blå i tabellen for køb og slag til levebrug, da det forvirrer i forhold til signaturfarver anvendt i figuren til levende og kælvet.
-----------------------------------	---

Blok: Kvier der når kælvnng



Tabel:

Overlevelse fra 1. levedag til kælvnng, %	Procentandel af kvierne, der har overlevet fra 1. levedag til kælvnng vises for: Egen driftsenhed mål og opnået 25% bedste 25% ringeste Farver i tabel tilpasses de samme farver som i Holdbarhedsdiagrammet.
---	---

Holdbarhedsgraf: [OBS Jørgen Nielsens beregninger](#)


Sandsynlighed for overlevelse / 1. kælvnng	Procent fra 0-100 vises på Y-aksen
Tid efter fødsel	Fødsel til 4 år vises på X-aksen
Levende	Markeres i grafen i det grønne område
Død	Markeres i grafen i det mørkerøde område og dækker over Død og Af-livning
Slagtet	Markeres i grafen i det lyserøde område

Forventet værdier	Følgende forventede værdier markeres: Forventet overlevelse ved 1. kælving angives i procent Gennemsnitlig kælvningsalder i mdr. med 1 decimal Gennemsnitlig alder ved kvietab angivet i mdr. Antal foderdage pr. produceret kvie i mdr. med 1 decima.
-------------------	---

Husk at tjekke nøgletallene på fanen 'Insemineringsstrategi' i Prognosen, da der er en tilknytning
Se desuden dokumentet Dokumentation_Holdbarhedsgrafer.docx

På figuren fjernes alle bulletpoints. Bullets points (B, C, D) er allerede i tabellerne under kælvekvie.

Blok: Gns. alder ved forventede kælvninger



Dyr erklæret positiv drægtig

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
Antal kvier					7	9	9	10	7	14	10	15	81
Forv. kælvningsalder, gns., mdr					24,4	23,9	24,8	24,1	23,7	24,4	25,2	25,1	24,5

Dyr insemineret, ukendt drægtighedsstatus

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
Antal kvier	20										1	4	25
Forv. kælvningsalder, gns., mdr	24,6										30,0	25,1	24,9

Tabel: Dyr erklæret positiv drægtige

Kalendertid, mdr.	Der angives kommende 12 mdr. med angivels af månedens tre første bogstaver, samt de sidste to cifre i årstal (f.eks. Jun '18)
Kviekalve (antal)	Antal kvier i driftsenheden, der dags dato er insemineret (følger regler fra Lars Sindbergs grundlagstabel) og erklæret positiv drægtig. Kvien indgår i antallet i den forventede kælvningsmdr.
Gennemsnitlig forventet kævealder, mdr.	For hver kalendermdr., angives den gns. forventede kævealder for de dyr, der forventes at kælte i den pågældende mdr. OBS! Kvier med udsættermarkering indgår ikke i gennemsnittet


Tabel: Dyr insemineret, ukendt drægtighedsstatus

Kalendertid, mdr.	Der angives kommende 12 mdr. med angivels af månedens tre første bogstaver, samt de sidste to cifre i årstal (f.eks. Jun '18)
Kviekalve (antal)	Antal kvier i driftsenheden, der dags dato er insemineret (følger regler fra Lars Sindbergs grundlagstabel), men ikke drægtighedsundersøgt. Kvien indgår i antallet i den forventede kælvningsmdr.
Gennemsnitlig forventet kævealder, mdr.	For hver kalendermdr., angives den gns. forventede kævealder for de dyr, der forventes at kælte i den pågældende mdr. OBS! Kvier med udsættermarkering indgår ikke i gennemsnittet

Diagram:

Forventet kælvningsalder	Antal vises på Y-aksen
Måned og år	De seneste 12 måneder vises på X-aksen Se generel beskrivelse øverst i dokumentet
Dataserier	<u>Visning på enkeltdyrsniveau:</u> Inseminerede dyr med ukendt drægtighedsstatus vises med en åben cirkel Drægtige dyr vises med en fyldt cirkel Udsætterdyr vises <u>ikke</u> uanset om de er drægtige eller ej! Dyr som er erklæret ikke drægtige efter seneste inseminering vises ikke. <u>Visning på gruppeniveau:</u> For inseminerede dyr med ukendt drægtighedsstatus vises en åben søjle, hvor højden markerer den gns. forventede kælvningsalder i mdr. For drægtige dyr vises en udfyldt søjle, hvor højden markerer den gns. forventede kælvningsalder i mdr.

Blok: Celletal ved 1. ydelseskontrol



Tabel:

Antal 1.kalvs med 1. yktr 14-60 dage efter kælvning	Antal dyr oplyses for egen driftsenhed
Geometrisk gennemsnit	Geometrisk gennemsnit vises for: Egen driftsenhed Bedste 25% Ringeste 25%
Nyinficerede (celletal > 100.000 celler), %	I procentandel af 1. kalvs kører med 1. yktr 14-60 dage efter klv. vises 1.kalvs med celletal på mere end 100.000 for: Egen driftsenhed Bedste 25% Ringeste 25%
Nøgletal bruges som indikator i Kviebarometret	Nøgletallet eksisterer i Nøgletalstjek og hedder 'Nyinf. 1.kalvs, 1. kontrol e. kælvn.' (tærskelværdien i Nøgletalstjek er standard sat til 150.000 men vi har i andre sammenhænge snakket om at det skal være 100.000). Følger DWH kriterier for periode afgrænsning osv.

Graf – Celletal ved 1. ydelseskontrol udvikling (Geometrisk gennemsnit)

Måned for ydelseskontrol	På X-aksen vises måneder i perioden
--------------------------	-------------------------------------

Celletal	På Y-aksen vises celletal
Ydelseskontroller	Ydelseskontroller i perioden er markeret som punkter på grafen

Blok: Ydelsesniveau og -variation hos 1. kalvs

Nøgletallene bruges som indikatorer i Kviebarometret

Ydelsesniveau og – variation hos 1.kalvs	Egen driftsenhed	Sammenligningsgruppe	
	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
Topydelse i forhold til 3+ køer, pct.	70,3	74,7	68,4
Variation mellem køer, pct.*	16,7	10,5	14,7

*Tolkning:

Et højt tal betyder, at der er stor forskel mellem de enkelte køers ydelsesniveau

Følgende tekster vises på lige fod med, hvis analyseudskriften LaktationsAnalyse åbnes på besætningen i DMS:

Bemærk:

Den model, der anvendes til visning af laktationskurven, synes ikke at passe til data for laktationsgruppen:

- Kurven har et afvigende forløb
- Nøgletal vises ikke for driftsenheden i tabellen
- Driftsenheden indgår ikke i sammenligningsgruppen

Bemærk:

Antal og fordeling af data i perioden er utilstrækkelig til at beregne "opnået kurve" og nøgletal.

Topydelse i forhold til 3+ køer, %	Ydelsen (sum af kg EKM 0-12 uger efter kælvning) for 1. kalvs køer vist i procent af ydelsen for 3+ køer. Vises for: Egen driftsenhed Bedste 25% Ringeste 25% Nøgletallet eksisterer i Nøgletalstjek summeret over 305 dages ydelsen, men skal bruges her for perioden 0-12 uger. Hentet ud fra LaktationsAnalysen dsa.LFLaktationsAnalyse
Variation mellem køer*, %	Vises for: Egen driftsenhed Bedste 25% Ringeste 75% *-markering henviser til tekst under tabellen, som vist på billedet ovenfor. Hentet ud fra LaktationsAnalysen dsa.LFLaktationsAnalyse

Blok: 1. kalvs der når 60 dage i laktationen

1.kalvs der når 60 dage i laktation	Egen driftsenhed		Sammenligningsgruppe	
	Mål	Opnået	25% bedste	25% ringeste
Overlevelse fra kælvning til 60 dage i laktation, %	?	96,7	98,9	94,3
Overlevelse fra 1. levedag til 60 dage i laktation, %	?	78,6	86,3	73,7

Overlevelse fra kælvning til 60 dage i laktation, % Nøgletal bruges som indikator i Kviebarometret	Jørgens beregning Vises for: Egen driftsenhed som mål og opnået 25% bedste 25% ringeste Nøgletallet har JNI beregnet tidligere i projektet. Se tabel for beregning af tallet
Overlevelse fra 1. levedag til 60 dage i laktation, %	Jørgens beregning Kvier der når frem til kælvning x holdbarhed af 1. kalvs kører til 60 dage efter kælvning. Vises for: Egen driftsenhed som mål og opnået 25% bedste 25% ringeste Nøgletallet har JNI beregnet tidligere i projektet. Se tabel for beregning af tallet

Alle mål skal tjekkes efter om de findes i målsætningsmodul eller beskrivelse til denne som kommer fra dette projekt. For hvert enkelt element skal der tages stilling til om vi tænker det vil være relevant at oprette siden hen så der bare skal stå 'mangler' eller lignende indtil vi har muligheden, eller om vi skal fjerne kolonnen.