

Forslag til valg af arter af efterafgrøder ved forskellige sædskifter med fokus på kartoffel/grøntsagssædskifter. Alle arter er godkendte som efterafgrøder ved forskellige såfrister i planperioden 2018/2019. Se mere information i [dyrkningsvejledning om efterafgrøder](#).

Sædskifte	Forslag til valg af art på sandjord ¹⁾	Forslag til valg af art på lerjord ¹⁾	Sådato senest ³⁾	Andre forhold
Uden vinterraps eller kål	olieræddike + vinterrug	gul sennep + vårbyg/havre ²⁾	20. august	Risiko for frøsætning i olieræddike.
	olieræddike + honningurt	olieræddike + vårbyg/havre ²⁾		
		olieræddike + honningurt		
Minimum 4 rapsfrie (eller kålfrie) år	olieræddike + vinterrug	olieræddike + vårbyg/havre ²⁾		Risoko for frøsætning i olieræddike.
	olieræddike + honningurt	olieræddike + honningurt		
3 rapsfrie år (eller kålfrie) eller færre	honningurt + vinterrug	honningurt + vårbyg/havre ²⁾	20. august	
	vårbyg/havre ²⁾ +			
Kartofler i sædskiftet	olieræddike + vinterrug/havre ²⁾	olieræddike+vårbyg/havre ²⁾	20. august	Olieræddike og havre virker sanerende på rodfiltsvamp.Olieræddike har effekt på fritlevende nematoder (<i>Pratylenchus sp.</i>). Risiko for frøsætning i olieræddike. Græs som efterafgrøde kan give problemer med rodfiltsvamp og smælderlarver. Gul sennep har i enkelte tilfælde ført til mere rodfiltsvamp og lavere udbytte.
Forud for arter, som er afhængige af Mycorrhiza (Fx løg og porrer)	vårbyg/havre ²⁾ + honningurt	vårbyg/havre ²⁾ + honningurt	20. august	Praksis tyder på, at glycosinilater fra korsblomstrede afgrøder kan hæmme spireevnen hos løg.
Efter løg og porrer	olieræddike, strukturator, vårbyg/havre ²⁾	olieræddike, strukturator, vårbyg/havre ²⁾	20. august	God jordløsning, men ved kraftige strukturskader kan også korsblomstrede have svære vækstbetingelser.
Vårsæd eller vintersæd (undersåning af efterafgrøde)	cikorie, gerne i blanding med græs	cikorie, gerne i blanding med græs	sås i april/maj (såfrist 1. august)	God jordløsning. Der kan være høstproblemer, hvis cikorie bliver for kraftig. Risiko for genvækst i cikorie.
Vårsæd eller vintersæd (undersåning af efterafgrøde)	græs	græs	sås i april/maj (såfrist 1. august)	Græs som efterafgrøde kan give problemer med rodfiltsvamp og smælderlarver og kan være et problem forud for kartofler og gulerødder.
Majs	græs, gerne med cikorie	græs, gerne med cikorie	sås i april/maj (såfrist 1.august)	God jordløsning. Risiko for genvækst i cikorie. Smælderlarver kan være et problem i græs forud for kartofler og gulerødder.

¹⁾Hvis det ikke er MFO-efterafgrødeblandinger kan første art vælges i renbestand.

²⁾Af havre kan benyttes almindelig havre eller sandhavre.

³⁾Der kan være risiko for frøsætning i olieræddike ved tidlig såning (før 1. juli). Dog kan der i år med meget gode vækstbetingelser også ske frøsætning i olieræddike sået senere end 1. juli. Man kan brakpudse og/eller nedvisne, for at undgå frøsætning. Nedvisning må ske efter 20. oktober. OBS: MFO-efterafgrødeblandinger må som udgangspunkt ikke slættes, afgræsses eller afpudses, dog er der en undtagelse i tilfælde af frøsætning.

Forslag til udsædsmængder i efterafgrødeblandinger.

Art 1	Art 2	Art 1	Art 2
		Kg pr. ha	
Olieræddike	Vinterrug	6-8	50
Olieræddike	Stauderug	6-8	40
Olieræddike	Vårbyg	6-8	50
Olieræddike	Havre	6-8	40
Olieræddike	Sandhavre	6-8	30-35
Gul sennep	Vinterrug	4-6	50
Gul sennep	Stauderug	4-6	40
Gul sennep	Vårbyg	4-6	50
Honningurt	Vinterrug	4	60
Honningurt	Stauderug	4	40
Honningurt	Vårbyg	3	60
Honningurt	Havre	3	40
Olieræddike	Honningurt	6-8	3-4
Gul sennep	Honningurt	5-7	3-4
Gul sennep	Olieræddike	3-4	8-9
Vinterrug	Vårbyg	50	50
Vinterrug	Havre	50	40

[Yderligere information kan findes i dyrkningsvejledning om efterafgrøder](#)