

10 TOMMELFINGERREGLER

Efterafgrøder

- 1** På **sandjord** giver efterafgrøder et merudbytte på 1-3 hkg pr. ha i forhold til ubevokset jord i vinterhalvåret.

 +1-3 hkg/ha

- 2** På **lerjord** er økonomien i efterafgrøder tvivlsom. Eftervirkningen i den følgende afgrøde vil ofte være negativ i tørre vintre. Men i de følgende år vil der være en positiv eftervirkning af kvælstof og en vis strukturforbedrende effekt.

- 3** Vælg vinterfaste arter på sandjord for at minimere udvaskningen. Udlæg af græs i vårsæd er en ret sikker løsning. Det er nemt at etablere, og efterafgrøden er klar til at optage kvælstof umiddelbart efter høst.



- 4** Efter **vintersæd** kan sås korsblomstrede arter eller honningurt evt. i blanding med korn.

- 5** De korsblomstrede arter kan opformere kålbrok, hvilket kan være en udfordring i **sædskeer med raps**.




- 7** I sædskeer med **roer** vælges sorter af gul sennep og olieræddike, som er resistente mod roecystematoder.



- 6** Olieræddike og havre kan have en vis sanerende effekt på fritlevende nematoder og rodtiltsvamp, og er et godt valg i **kartoffelsædskeer**.



- 8** På **sandjord** opfyldes efterafgrødekravet normalt bedst ved at have efterafgrøder i stedet for at anvende de andre muligheder, der kan erstatte efterafgrøder.



Såning af efterafgrøder før høst af kornet er en mulighed for at få sået efterafgrøderne til tiden, men metoden er mere usikker end såning efter høst.

9



- 10** På **lerjord** vil der ofte være bedre økonomi ved at vælge tidlig såning af en del af vintersæden eller nedsat kvote fremfor efterafgrøder, men det afhænger af udbytteforholdet mellem vintersæd og vårsæd.