



## HVORNÅR SKAL DE EFTERÅRSSÅEDE AFGRØDER SÅS I 2018?

STØTTET AF

### Promilleafgiftsfonden for landbrug

Den vejrtype, der har givet den langvarige tørke, ser foreløbig ud til at fortsætte. Udsigterne tyder ikke på større mængder regn eller et egentligt vejrskifte i nær fremtid.

**Derfor anbefales det at vente med såning af efterafgrøder. Ligeledes anbefales det at vente med at så vinterraps og frøgræs til der er faldet større mængder vand, og der er udsigt til et skift i vejrtype.**

## EFTERAFGRØDER

Behovet for efterafgrøder til at opsamle kvælstof bliver stort i år. Det anbefales derfor at så efterafgrøder på alle arealer forud for vårsæd, hvis vejret tillader en sikker og rettidig etablering. Jo før efterafgrøden bliver etableret, jo bedre virker den! Etableringen afhænger både af, hvor meget nedbør, der er faldet op til såningen, men også af den efterfølgende nedbørsmængde og vejrtype. Hvis der ikke kommer nedbør indenfor 14 dage efter såning risikerer man, selvom efterafgrøden sås i fugtig jord, at frøene spirer, men at de små planter tørrer ud og dør ved de høje temperaturer. De nuværende prognoser fra DMI lover ikke et skift i vejrtypen foreløbigt. Derfor anbefales det fortsat at vente med at så efterafgrøder til der loves mere nedbør og lavere temperaturer. Det er dog vigtigt at foretage en samlet vurdering omkring d. 10. august, så også hensynet til lovgivningen vurderes. Forholdene i den enkelte mark og forventningen om nedbør skal vurderes lokalt.

Hvordan efterafgrødere reglerne håndteres diskuteres lige nu, og Landbrug & Fødevarer er i dialog med Landbrugsstyrelsen omkring dette. Den foreløbige udmelding kan ses [her](#).

# VINTERRAPS OG FRØGRÆS

En sikker etablering af vinterraps og frøgræs er afgørende for udbyttet. Det er derfor vigtigt, at både vinterraps og frøgræs sås i fugtig jord, og at der efterfølgende falder betydelige mængder regn. Derfor anbefales det at vente med såning af vinterraps og frøgræs, indtil der både er kommet en tilpas mængde nedbør, som sikrer at afgrøden kan spire, og der er udsigt til passende mængder nedbør efterfølgende, så afgrøden kan udvikle sig.

Jordtemperaturen er forholdsvis høj, og derfor må man forvente en hurtig fremspiring, når der bliver sået i en jord med passende fugtighed.