

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Poul Henning Petersen

- Landskonsulent,
- Seges PlantelInnovation

Kom sjældent ukrudt til livs, før det for alvor breder sig

Af landskonsulent Poul Henning Petersen, Seges PlantelInnovation

Pigæble, kantbæger, kinajute og kæmpe hejre har det til fælles, at de kun er set af og til som ukrudt i danske marker, og derefter forsvundet igen.

Ændringer i sædskifte, dyrkningsmetoder og temperaturstigninger betyder, at disse arter nu får bedre betingelser og enten giver eller er på vej til at give problemer som ukrudt.

Pigæble og kantbæger

Pigæble og kantbæger er endnu ikke så udbredte, men ses stedvist som pletter i kartoffelmarker. Det er tegn på, at der er behov for en skærpet indsats for at få disse pletter bekæmpet og undgå frøsætning, der holder bestanden ved lige - eller værre, giver anledning til opformering.

Kinajute og kæmpe hejre

Kinajute ses af og til i roemarker, hvor den kan være kommet med frøet. Det er som regel kun enkelte planter, som det er overkommeligt at afluge.

Kæmpe hejre er indtil videre set på en enkelt lokalitet med pløjefri dyrkning i det nordvestlige Jylland. Den har biologi som de øvrige hejrearter og skal derfor



Pigæble.
Foto: Lars Bødker, Seges.



Kinajute.
Foto: Seges.



Kæmpe hejre.
Foto: Michael D. Fleng, Sagro.



Hanespore i vårbyg.
Foto: Nis Callesen, LandboSyd.

bekæmpes og forebygges på samme måde.

Hanespore

Hanespore er udbredt i majs, men har hidtil været sjælden i andre afgrøder. De seneste par år er den ofte set i vårsæd, især i kørespor hvor afgrøden ikke konkurrerer. Den spredes især med maskiner, men også med dyr og fugle. Hold derfor øje selvom du ikke har majs.

Gør alt hvad du kan

Belært af erfaringerne med eksempelvis væselhale, som siden

Gå målrettet efter de første, så det bliver de sidste, opfordrer Poul Henning Petersen om flere sjældne ukrudtsarter, der ikke er ret udbredt endnu.

1990'erne er spredt fra enkelte frøgræsmarker til nu at være udbredt over hele landet, er der all mulig grund til at gøre alt, hvad man kan for at komme de nyankomne ukrudtsarter til livs.

Det kan være lugning af enkeltplanter og afpudsning af pletter inden frøsætning.

Nye ukrudtsarter

- Pigæble (*Datura stramonium*) ses især i kartofler.
- Kantbæger (*Nicandra physalodes*) ses især i kartofler.
- Kinajute (*Abutilon theophrasti*) ses engang imellem i roer.
- Hanespore (*Echinochloa crus-galli*) er kendt i majs siden 1980'erne, men ses nu også i mange andre afgrøder.
- Kæmpe hejre (*Bromus giganteus*) set opformeret ved pløjefri dyrkning.