

Indledning

Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for skadedyr i landbrugsafgrøder. Tærsklerne i korn er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. De øvrige bekæmpelsestærskler er anslået og må derfor betragtes som vejledende.

Korn

Bladlus

Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 73: 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse.

Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 73: 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse.

Vinterhvede og vårsæd vækststadium 74-75: 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.




BILLEDE 1. BLADLUS I HVEDE.

Kornbladbiller

0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå indtil omkring begyndende skridning.

Hvedegalmyg

Fangst af over 120 hvedegalmyg pr. dag i opstillede feromonfælder, såfremt hveden er i det modtagelige vækststadium (begyndende skridning til begyndende blomstring). Fanges der over 30 hvedegalmyg pr. dag, er der også en vis risiko, men det er mere usikkert, om sprøjtningen bliver rentabel.



BILLEDE 2. HVEDEGALMYG I FEROMONFÆLDE.

Rug og tritcale

Trips

0,5-1 mørke trips pr. bladskede.
Bekæmpelse skal udføres lige før
begyndende skridning i vækststadium.
45.



BILLEDE 3. TRIPS I RUG.

Ærter og hestebønner

Bladrandbiller

Gennemsnitligt mere end 1 gnav pr. plante i de tidlige vækststadier.

Ærtebladlus og bedebbladlus

10-15 pct. angrebne planter og
begyndende kolonidannelse.
Ablomstring og fuld bælg længde:
Over 50 pct. angrebne planter.



BILLEDE 4. ÆRTEBLADLUS.

Skyggeviklere

5-10 pct. sammenviklede topskud før blomstring.



BILLEDE 5. SKYGGEVIKLERLARVE.

Kløverudlæg

Bladrandbiller

Svagt udviklet kløver: 20 pct. angrebne planter.

Kraftigt udviklet kløver: Bekæmpelse sjældent aktuel.



BILLEDE 6. BLADRANDBILLE I HESTEBØNNER.

Bederoer

Ferskenbladlus

Ved konstateret forekomst eller ved varslings.



BILLEDE 7. FERSKENBLADLUS.

Bedebladlus

Over 50 pct. angrebne planter med begyndende kolonidannelse (en koloni er mindst 10 bladlus).



BILLEDE 8. BEDEBLADLUS. FOTO: ANNE LISBETH HANSEN.

Uglelarver

4-5 larver pr. plante.




BILLEDE 9. UGLELARVE.

Vårraps

Glimmerbøsser

Tidligt knopstadium: 2,0
glimmerbøsser pr. plante.

Sent knopstadium: 6,0 glimmerbøsser
pr. plante.



BILLEDE 10. GLIMMERBØSSER. FOTO: ERIK NYGAARD PEDERSEN,
LANDBOMIDTØST

Vinterraps

Rapsjordlopper

De voksne bekæmpes ved over 10 procent bortnavet bladareal frem til og med 4 løvbladstadiet.

Bekæmpelse rettet mod larver udføres ved en fangst af 25 rapsjordlopper indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden i gule fangbakker (radius 11 cm, areal ca. 380 cm²). Der anvendes ca. 2 fangbakker pr. 10 ha.



BILLEDE 11. RAPSJORDLOPPER I GUL FANGBAKKE.

Glimmerbøsser


Tidligt knopstadium, 30-50 planter/m²:
8 glimmerbøsser pr. plante.

Tidligt knopstadium, 50-70 planter/m²:
6 glimmerbøsser pr. plante.

Sent knopstadium, 30-50 planter/m²:
10 glimmerbøsser pr. plante.

Sent knopstadium, 50-70 planter/m²: 8
glimmerbøsser pr. plante.

Er planterne svækkede, halveres
tærsklerne for glimmerbøsser.



BILLEDE 12. GLIMMERBØSSER. FOTO: ERIK NYGAARD PEDERSEN, LANDBO MIDTØST

Skulpegalmyg

Ved erfaring for kraftige angreb.



BILLEDE 13. SKULPEGALMYG.

Skulpesnudebiller

1-2 biller pr. plante fra begyndende blomstring.



BILLEDE 14. SKULPESNUDEBILLE. FOTO: ERIK NYGAARD PEDERSEN, LANDBOMIDTØST