



BEKÆMPELSE AF FRITFLUER I SENTSÅET HAVRE

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Havre i 1,5-2 bladstadiet er følsom for angreb.

I sentsåede havremarker skal man i maj være opmærksom på evt. angreb af fritfluens 1. generation. I efteråret 2018 optrådte der i flere vintersædsmarker især rug som bekendt mere udbredte angreb af 3. generation fritfluer. Se også [Angreb af fritfluelarver i vintersæd](#). Der kan derfor være forøget risiko for angreb af 1. generation fritfluer i sentsåede havremarker i år.

Tidspunktet for flyvning af 1. generation fritfluer kan følges her. Temperaturmodellen siger kun noget om forventet tidspunkt for forekomst af 1. generation fritfluer og siger desværre ikke noget om angrebsstyrken.

Fritfluerne er især aktive og lægger mange æg, når det er varmt, vindstille og tørt. De optimale betingelser er ved 20° C, mens 12 °C er minimum.

Kun afgrøder i 1,5 - 2 bladstadiet er følsomme for evt. angreb af 1. generation fritfluer. Vårsæd, græs og majs kan angribes. Angreb ses hyppigst i havre, hvor bekæmpelse kan være aktuel ved overskridelse af temperatursummen, såfremt der samtidig er gode betingelser for flyvning af fritfluer (varmt og tørt), og havre er i 1,5-2 bladstadiet. I de øvrige afgrøder ses betydende angreb sjældent, og bekæmpelse anbefales ikke. Flyvningen forventes at vare ca. to til tre uger.

Ved angreb af fritfluens larve i havre bliver hjerteskuddene gule. Strækningsvæksten udebliver, og planterne får en lav vækst med mange sideskud.

Til bekæmpelse i havre kan anvendes 0,25 kg Karate WG pr. ha.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

