



DER ER GAVNLIGE SNYLTEHVEPSE I RAPSEN

STØTTET AF


Promilleafgiftsfonden for landbrug

Flere snyltehvepsearter er gavnlige, fordi de ligger æg i larver af skadedyr i raps, så larverne dør. Der bliver derfor færre skadedyr året efter.

Vi har netop modtaget nedenstående billeder af snyltehvepse i raps. Marken er ikke behandlet mod skadedyr i foråret.

Flere snyltehvepsearter er gavnlige, fordi de ligger æg i larver af skadedyr i raps, så larverne dør. Der bliver derfor færre skadedyr året efter. F.eks. er der i tyske undersøgelser fundet, at 45-83 procent af glimmerbøsselarverne blev parasitteret af snyltehvepse og 30-70 procent af skulpesnudebillelarverne blev parasitteret.

På foto 4 ses larver af glimmerbøsser, som nu også kan findes i blomsterne i nogle vinterrapsmarker. Larverne tillægges kun meget begrænset betydning.





Billede 1. Mange snyltehvepse i raps fotograferet 14. maj 2019 af Kasper Holm Kristensen, LMO.





Billede 2. Nærbillede af billede 1 fotograferet 14. maj 2019 af Kasper Holm Kristensen, LMO.



Billede 3. Nærbillede af snyltehvepseart, der parasitterer larver af rapsjordlopper i foråret. Foto: Vibeke Langer, Københavns Universitet.





Billede 4. Larver af glimmerbøsser på kronblad fotograferet 15. maj 2019 af Mads Brandt, Landbrugsrådgivning Syd. Nogle af glimmerbøsselarverne dør pga. angreb af snyltehvepse.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.