

FORÅRSKLARGØRING AF GRÆSMARKEN

STØTTET AF


Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det ser ud til at blive et tidligt forår, og snart tid til et forårstjek af græsmarkerne.

I skrivende stund er græsmarkerne grønne, og det ser ud til en god overvintring. Et forårstjek er dog en god aktivitet for at se, om der er pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning. Vurder bestanden af kløver, og om der skal sendes bud efter muldvarpejægeren. For desværre har de små lodne dyr været aktive gennem den milde vinter.

HURTIGT OVERBLIK OVER MARKERNE

I cropmanager.dk kan du let få overblik over biomassen i de enkelte marker ved at klikke på "Markanalyser" i menuen til venstre, og derefter vælge "biomasse", fås et billede som nedenstående hvor du i kalenderen øverst til højre kan se hvornår der er tilgængelige satellitdata, og hvorvidt billederne er taget i skyfrit vejr, symboliseret med sol/skyer. I eksemplet herunder gælder, at jo lysere farve, jo lavere biomasse, hvorfor opmærksomheden bør rettes mod disse marker, medmindre der er en kendt årsag til hvorfor biomassen er lavere i disse marker.





NORMAL FORÅRSPLEJE AF GRÆSMARKEN

Er græsarealet i orden, kan man gøre klar til at optimere græsmarksdriften efter følgende tjekliste:

- Lav en strategi mod muldvarpe. Der er mange i år, og de kan blive en plage. Flere har en fast aftale med en muldvarpejæger eller en ældre nabo, så du kan koncentrere dig om de dyr, der giver mælk.
- Troml arealet for småsten, som er løftet op af frosten, og udjævn evt. muldskud, når jorden er så tør, at traktoren og tromlen ikke laver skader på græsmarksplanterne. Er der ingen muldvarpeskud eller sten, bør tromlen blive hjemme – græsset har ikke bedt om at blive tromlet ned!
- Er tromlen forsynet med en strigle og udjævningsplanke, må striglen ikke gå så aggressivt, at den river udløberne på hvidkløver op, og udjævningsplanken må ikke klemme og presse græsset, som let kan skades. I år burde det ikke være nødvendigt at anvende en strigle på de overvintrende marker. Den kan kun gøre skade, når der ikke er vissent græs.
- Skulle der være pletter med vissent græs, bør det afpudsnes, så det ikke hindrer for solens indstråling.

SÅDAN VURDERER DU PLANTEBESTANDEN

På arealer med sædskiftegræs skal man være meget kritisk, når græsset vurderes. Der bør ikke være større pletter med dødt græs, med mindre der er en særdeles god bestand af hvidkløver, som kan erstatte produktionen. Pletter større end 20x30 cm er for meget. Med hensyn til overfladedækning bør der generelt maks. mangle 5 pct. på arealer med græs og maks. 10 pct. på arealer med kløvergræs.

Tæl de overlevende græsplanter i sårækken.

Til afgræsning bør der være 30-40 og til slæt 20-25 planter pr. meter sårække.

ISÅNING I EKSISTERENDE GRÆSMARKER

I yngre græsmarker (fx. i 1. brugsår) kan en tynd bestand af græs med mindre pletter som følge

af tørken repareres ved isåning af nyt græs eller kløvergræs, hvis det udføres i tidligst muligt i marts/april. Isåningen gennemføres bedst med skiveskær. På ældre græsarealer med betydelige tørkeskader er udbyttet af en isåning for dårligt. De skal pløjes!
