



ANGREB AF FRITFLUER I MAJS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De angrebne planter er lavere og har forrevne blade.

Der er meldt om angreb af fritfluer i flere majsmarker. Vi har modtaget nedenstående billeder fra Sønderjysk Landboforening.

Betydende angreb af fritfluer i majs er sjældne, og bekæmpelse foretages almindeligvis ikke. Karate er godkendt til bekæmpelse, som skal udføres i 1,5-2 bladstadiet.

Planterne er kun modtagelige for angreb i 1,5-2 bladstadiet. Normalt vokser majs så hurtigt, at planterne kun er modtagelige en meget kort periode. I forbindelse med nattefrost kan væksten i år dog have været langsommere, og planterne kan derfor have været modtagelige i en lidt længere periode. 1. generation fritfluer flyver fra omkring midten af maj.

De angrebne planter har forrevne blade. Dette skyldes larvens gnav på endnu ikke udfoldede blade på et tidligere tidspunkt. De angrebne planter er lavere og har øget tendens til sideskudsdannelse. Sideskudsdannelse kan dog også skyldes stressede planter og en brat overgang fra køligt vejr til masser af sol.






Foto 1. Angreb af fritfluer i majs fotograferet 12. juni 2019 af Torben Viuf, Sønderjysk Landboforening.



Foto 2. Angreb af fritfluer i majsens til højre fotograferet 12. juni 2019 af Torben Viuf, Sønderjysk Landboforening.



Foto 3. Angreb af fritfluer i 3 majsplanter fotograferet 12. juni 2019 af Torben Viuf, Sønderjysk Landboforening.






Foto 4. Fritfluelarve og -puppe fundet i angrebne majsplanter og fotograferet 19. juni 2019. Larverne er hvide, lemmeløse og med sort mundbrod og ca. 3-4 mm lange.