

GRÆSMØL I FRØGRÆS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ved mere udbredte angreb kan der ikke efterfølgende sås vintersæd i efteråret.

Den senere tid er der modtaget nogle henvendelser om angreb af græsmøllarver i frøgræs. Larvernes gnav får græsset til at visne. Larverne er ca. 1,5 cm i udviklet tilstand og brune eller hvide med brunt hoved. Kroppen er besat med mørke vorter med enkelte børstehår. Se fotos.

Græsmøl angriber græsser og korn. Larverne forpupper sig ultimo april til maj (nøjagtigt tidspunkt kan ikke angives). Ved kraftige angreb i frøgræs kan der således ikke efterfølgende sås vintersæd i efteråret. Vårsæd kan også angribes ved tidlig såning. Bredbladede afgrøder angribes ikke.

Det er ikke muligt at bekæmpe larverne.

Se også Angreb af larver i frøgræs og vintersæd.



Billede 1. Angreb af græsmøl i rødsvingel fotograferet den 26. september 2019 af Bernt Rasmusen, DLF.



Billede 2. To græsmøllarver og to løvsnudebillelarver (mindre og lemmeløse) fotograferet 26. september af Bernt Rasmusen, DLF.



Billede 3. Græsmøllarve. Bemærk de enkeltstående hår, som især ses, når larverne holdes op

mod lyset. Larverne har som alle sommerfuglelarver ben forrest og gangvorter.

© 2021 - SEGES Projektsitet