



MINDRE ANVENDELSE TIL KARATE MOD BYGFLUER I VINTERSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bekæmpelse af bygfluer i vintersæd vurderes kun aktuel i relativ få tilfælde.

Miljøstyrelsen oplyser, at der netop er givet en mindre anvendelse til brug af Karate 2,5 WG mod bygfluer i vintersæd i efteråret. Karate har også en mindre anvendelse mod bygfluer i vårhvede og vårbyg. Se [Mindre anvendelse til Karate 2,5 WG mod bygfluer i vårhvede og vårbyg](#).

Karate må i vintersæd anvendes i vækststadiet 11-12 (1-2 løvblade) i september-oktober.

Der må maks. anvendes 0,2 kg/ha pr. behandling og maks. bruges 0,6 kg/ha Karate pr. vækstsæson. Der skal være mindst 2 uger mellem behandlingerne.

Behovet for at bekæmpe bygfluer i vintersæd vurderes som værende lavt, da vintersæd er god til at kompensere for angreb. Bekæmpelse kan undtagelsesvis være aktuel i tidligt såede (før ca. 15.-20. september) vintersædsmarker direkte nabo til kraftigt angrebne vårhvedemarker. Se yderligere om bekæmpelse i vintersæd i [Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd](#).

Det er ved "mindre anvendelse" en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen.

Se vejledningen mv. i [middeldatabasen](#).