



MINDRE ANVENDELSE TIL PICTOR ACTIVE MOD SVAMPE I HESTEBØNNER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ifølge firmaet ligger effekten og merudbyttet på niveau med Signum og Amistar.

Miljøstyrelsen meddeler, at **Pictor Active** har fået en mindre anvendelse til svampebekæmpelse i hestebønner.

Der må pr. vækstsæson maks. anvendes 1,0 l/ha. Der kan anvendes en enkelt behandling eller en split behandling på 2 gange 0,5 l/ha. Der skal være 7-21 dage mellem behandlingerne. Behandlingerne skal udføres i vækststadium 51-75 (første knopper synlige til 50 pct. bælg i fuld størrelse).

Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

Pictor Active har ikke indgået i landsforsøgene eller andre danske forsøg. Fra firmaet er der modtaget et referat af resultater fra 8 forsøg, hvor effekten mod rust og chokoladeplet samt merudbyttet ved brug af 1,0 l Pictor Active ligger på samme niveau som ved brug af 1,0 kg Signum (5 forsøg) og 1,0 l Amistar (3 forsøg). Såfremt der modtages flere resultater, vil det blive formidlet på Landbrugsinfo.

Det er ved "mindre anvendelse" en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen.

Se vejledningen mv. i [middeldatabasen](#).