



NEDVISNING AF HESTEBØNNER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.

NEDTØRRING AF FRØ ER BEGRÆNSET

Høst af hestebønner langt ind i september kan være en udfordring ved dyrkning af hestebønner. 7 forsøg i 2017-18 viser, at nedvisning af hestebønner kun marginalt påvirker vandindhold i frøene ved høst og derfor sjældent vil bringe vandprocenten i frøene så langt ned, at tørring kan undgås. Hvis vandindholdet i bedste fald reduceres med 1-2 procent, bliver besparelsen til tørring omkring 125-250 kr. pr. ha ved et udbytte på 50 hkg pr. ha. Omkostningen til kemi, kørsel og køreskade vil beløbe sig til omkring 400 kr. pr. ha.

Behovet for nedvisning kan være til stede i marker med meget uens modning eller hvor ukrudtsbekæmpelsen har svigtet, så ukrudtet har en betydelig grønmasse. Endvidere kan nedvisning være en sidegevinst ved behov for at bekæmpe kvik eller andet rodukrudt.

SÅDAN GØR DU

Til nedvisning bruger du 1440 g glyphosat pr. ha. Tilsæt ammoniumsulfat og spredklæbemiddel, som uanset produkt vil sikre større optagelse under forhold med lav luftfugtighed. Nedvisning af en stor grønmasse tager normalt omkring 3 uger, men vil afhænge af vejrforholdene. Vejledende skal der sprøjtes når $\frac{3}{4}$ af bælgene er sorte i størstedelen af marken, dvs. at vandindholdet i frøene er ca. 30 procent. Anvend afdriftsreducerende dyser med 150-170 l vand pr. ha. Det giver store dråber, som trænger ned i afgrøden.

SPILDFRØ

Ved såning af vintersæd efter hestebønner uden pløjning vil der ofte efter såning spire hestebønner frem. En øverlig stubbearbejdning lige efter høst kan bringe mange spildfrø til spiring, så de 10-12 dage senere vil blive nedvisnet med glyphosat før såning. Undgå dyb jordbearbejdning, som bringer ukrudtsfrø af f.eks. spildraps og græsukrudt ned i større dybde, hvor frøene går i spirehvile og først vil spire ved en senere lejlighed. Fremspiring af hestebønner, der ikke presser vintersæden i efteråret, er uden betydning. Hestebønner udvintrer i en normal vinter.