



MELDUG OG RUST I MANGE VINTERSÆDSMARKER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Meldug, bygrust og brunrust dominerer. Evt. bekæmpelse er først aktuel senere ved væsentlig nyvækst, da formålet er at beskytte de mere blivende blade.

Der er den senere tid modtaget mange meldinger om meget meldug i mange vintersædsmarker. I vinterbyg og rug er der i mange marker også fundet meget bygrust hhv. brunrust. I tritcale er der fundet meget gulrust i nogle marker. Se billeder fra 2. marts nedenfor. I hvede er der også modtaget nogle meldinger om brunrust.

Den milde vinter har medført, at bladene kun er nedvisnet i begrænset omfang, og svampene har derfor haft bedre muligheder for at overleve. Mildt vejr giver også en hurtigere sygdomsudvikling. F.eks. er inkubationstiden (tiden fra smitte til nye angreb ses) for meldug 28 dage ved 4 °C og 13 dage ved 8° C. Der er således pt. mere smitstof end normalt.

Når der kommer mere vækst i markerne, er det derfor vigtigt at følge udviklingen. Evt. bekæmpelse er først aktuel ved væsentlig nyvækst, da formålet er at beskytte nye mere blivende blade.

Udviklingen af bladsvampe i vintersæd kan også følges i registreringsnettet fra primo april, hvor sortsforskelle også vil kunne ses.





Billede 1. Meldug og bygrust i vinterbyg. Alle planter var angrebet i marken.



Billede 2. Meldug og bygrust i vinterbyg.



Billede 3. Brunrust og meldug i rug.



Billede 4. Meldug og enkelte pustler af brunrust i rug. Alle planter var angrebet af meldug i marken, og mange var også angrebet af brunrust.



Billede 5. Gulrust i tritcale. Der var sådanne "reder" af gulrust i store dele af marken.





Billede 6. Nærbillede af gulrust i triticale.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.