



HØST AF KERNEMAJS - AP5

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernerens tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere høst øger risikoen for angreb af Fusarium. I CropManager kan du følge prognosen for vandprocenten i dine marker.

Kernemajs høstes så snart den sorte plet er synlig ved kernerens tilhæftningssted og med højst 40 pct. vand. Normalt er det 3-4 uger senere end høsttidspunktet for helsæd, men med den tidlige udvikling i år forventes det kun at være 2-3 uger senere end helsædstidspunktet. Når vandindholdet er kommet ned på 40 pct., afhænger det optimale høsttidspunkt af den metode, som anvendes ved opbevaring af kernemajsen. Opbevaringsmetoden er derfor det andet kriterium for valg af høsttidspunkt. Se forskellige muligheder for opbevaring i

[Dyrkningsvejledningen for kernemajs.](#)

På helsædstidspunktet har kernerne et vandindhold på 50 procent. Som gennemsnit af 30 landsforsøg i 2012-2017 har ændringen i vandprocenten i kernemajs været således pr. døgn:

	Ændring i vandprocenten pr. døgn
15. sept.	-0,6
30. sept	-0,3
15. okt.	-0,1
25. okt.	0

Fra midten af oktober falder vandindholdet kun meget svagt i kernemajs. Selvom vandindholdet ikke ændrer sig væsentligt, vil den fysiologiske modning fortsætte hen imod den sorte plet på kernerne, så længe stængel og kolbe ikke er frostsprængte. Den sorte plet skal være synlig, for at kernerne kan tærskes af spindlen. Sen høst øger risikoen for angreb af Fusarium. Det anbefales at få foretaget en analyse af indholdet af fusariumtoksiner, før kernemajsen anvendes som svinefoder.

På LandbrugsInfo på [siden for kernemajs og CCM-majs](#) kan du fra 20. september følge vandindholdet i en majsmark til kernemajs fem steder i landet.

I [cropmanager.dk](#) kan du følge prognosen for vandprocenten i kernemajs på dine egne majsmarker til kernemajs. I prognosen indgår automatisk din sort og registeret sådato på marken, samt de lokale vejrdata for netop dit område. Prognosen bygger på det målte klima indtil den aktuelle dag, på vejrpagnosen den følgende uge og på 30-årsnormen derefter. Prognosen håndterer sorter, som har deltaget i landsforsøgene med sorter til kernemajs i 2017 og 2018, dvs. sorterne Ambition, Gatsby, Glory, LG30179, Martinez KWS, Pinnacle og Yukon.

Prognosen gælder for en gennemsnitsmark, som ikke er skadet af tørke, og hvor der ikke er større mængder ukrudt. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i de aktuelle forhold og supplere med en eller flere af nedenstående metoder til vurdering af vandprocenten i kernemajs. Se mere om prognosen i CropManager [her](#).

HØSTTIDSPUNKTET FASTSÆTTES EFTER VÆSENTLIGE FORHOLD SOM:

1. Vandprocenten	Når indholdet af vand i kernerne er højest 40 procent, afgør opbevaringsmetoden den optimale vandprocent, se forskellige muligheder for opbevaring i Dyrkningsvejledningen for kernemajs .	
2. Lejesæd	Høst før en begyndende væltning eller nedknækning får betydende omfang for udbyttet.	
3. Høst inden middeldøgns-temperaturen kommer vedvarende under 10 °C	Når middeldøgns-temperaturen kommer under 10 °C, er der risiko for, at udbyttet begynder at falde i kernemajs. Dette sker normalt i sidste halvdel af oktober.	
4. Frost	Skadens omfang	Handling
	Kun bladspidser eller partier af marken er visnet, og der er grønne blade eller bladele.	Afgrøden betragtes som en afgrøde i forsat udvikling. Kerneindlejringen fortsætter, og vandprocenten vil fortsat falde.
	Størstedelen af bladene er visnet, mens kolbe og stængel er	Kerneindlejringen er stort set stoppet, men der vil fortsat ske en omlejring af sukker i stængel til stivelse i kernerne, og vandprocenten vil fortsat falde. Afgrøden skal høstes, så snart den sorte plet er synlig på

	intakte.	kernernes tilhæftningssted.
	Hele planten er frostsprængt på grund af temperaturer under - 4 °C.	Afgrøden skal høstes hurtigst muligt efter optøning, eller så snart majsens kan tærskes. Der er stor risiko for, at planterne vælter, og kolberne knækker ned. Høst ikke frossen majs, da det hindrer ensileringsprocessen, og det kan tage flere måneder for stakken at tømme op.

Majsen høstes, så snart ét af ovenstående kriterier er opfyldt, da en udsættelse af høsten øger risikoen for et faldende udbytte, for at planterne knækker ned i blæsevejr og for angreb af *Fusarium*. Selv om forholdene i punkt 1 er ideelle og langt må foretrækkes, kan det være forholdene under punkt 2, 3 og 4, der bestemmer høsttiden.

METODER TIL VURDERING AF VANDPROCENTEN

Den sorte plet	Bræk kolben midt over. Pil kerner ud, og se på kernernes tilhæftningssted. Når den sorte plet er synlig på kernernes tilhæftningssted, kan kernerne tærskes af spindlen. Sker dette inden slutningen af oktober, er vandprocenten som regel omkring 40 procent. Den sorte plet er tegn på, at indlejringen af tørstof i kernerne er stoppet. 
Bestemmelse af vandindhold	Indholdet af vand kan bestemmes ved at plukke kolberne på tre planter i træk tre steder repræsentativt i marken. Kernerne skrælles af spindlen, og der foretages en bestemmelse af vandprocenten i kernerne. Vandbestemmelsen kan ske i tørreskab, eller på NIT-apparater, som er opkoblet til "Korn NIT-netværk" (for eksempel NIT-apparater hos grovvareforretningerne). De elektriske apparater baseret på måling af ledningsevne er ikke særligt brugbare ved så høje vandprocenter.