

# Store sortsforskelle i hvede



Der er store forskelle på hvedesorternes aks.

**Hvedesorterne adskiller sig betydeligt i deres vækst og udbyttekomponenter, viser nye undersøgelser.**

Af Merete Hattesen  
meh@landbrugsmedierne.dk  
tlf. 33 39 47 53

KWS Extase har en kraftig vækst både efterår og forår, mens Informer har en

kraftig vækst i efteråret og en svag vækst i foråret pga. en svag buskning. Og Torp har en svag vækst både efterår og forår pga. en svag buskning og en relativt sen afmodning. Så store er forskellene mellem tre udbredte vinterhvedesorter i Danmark. Det fortalte Lars Bonde Eriksen, landskonsulent i korn på Seges, på en temadag for korn og raps på Vestermølle ved Skanderborg først i december. Her blev re-

sultaterne fra de to-årige projekter »Prokorn« og »Hæv udbyttet i vinterraps« vist frem. **Opbygning af udbytte** »Hvedesorterne adskiller sig betydeligt fra hinanden i måden, de opbygger deres udbytte på«, fortæller han. Udbyttet defineres af: antal aks pr. kvm x antal kerne pr. aks x kernevægten (TKV). »De buskende sorter har mange aks pr. kvm. Men ak-

Vinterhvedesorternes egenskaber, \* lav værdi og \*\*\*\* høj værdi

| Sort         | Vækst efterår |           | Vinterfasthed | Vernaliseringsbehov | Egnethed til tidlig såning | Udbyttekomponenter |            |      |
|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|------|
|              | Type          | Udvikling |               |                     |                            | Buskning           | Kerner/aks | TKV  |
| Informer     | Flad          | Kraftig   | ****          | ****                | ***                        | *                  | **         | **** |
| Kvium        | Opret         | Kraftig   |               | ****                | ***                        | **                 | **         | ***  |
| Sheriff      | Mellem        | Svag      | ***           | *                   | ***                        | ***                | ***        | **   |
| KWS Extase   | Opret         | Kraftig   |               | ****                | *                          | ***                | *          | ***  |
| Graham       | Flad          | Svag      | ***           | **                  | ****                       | ****               | *          | ***  |
| Benchmark    | Flad          | Middel    | ***           | ****                | ***                        | ***                | **         | **   |
| Drachmann    | Opret         | Kraftig   | **            | ***                 | **                         | ***                | **         | **   |
| Torp         | Opret         | Svag      | ***           | ****                | ***                        | *                  | ****       | **   |
| KWS Lili     | Mellem        | Svag      | *             | *                   | *                          | **                 | ***        | **   |
| Kalmar       | Mellem        | Middel    | ***           | ***                 | ***                        | ****               | *          | *    |
| KWS Scimitar | Mellem        | Kraftig   |               |                     | ***                        | **                 | **         | ***  |
| KWS Zyatt    | Opret         | Svag      | **            | *                   | **                         | ***                | *          | ***  |
| KWS Firefly  | Mellem        | Svag      |               |                     | ***                        | *                  | ***        | ***  |

Vernaliseringsbehov: behov for kulde, inden strækningsvæksten starter. TKV: Tusindkornsvægt

- Hvedesorter
- Nedsæt udsædsmængden ved tidlig såning.
  - I svagt buskende sorter øges udsædsmængden med 20-40 planter.
  - Så kraftigtvoksende sorter til sidst og svagt voksende først.
  - Egnede sorter til tidlig såning: Krybende vækst og langsom udvikling i vegetativt stadie. Stor frosttolerance.

når de sås tidligt (1.-7. september), og andre giver bedst, når de sås sent (20.-30. september). »Man bør undlade tidlig såning af sorter, der har kraftig efterårsvækst og tidlig vækststart i foråret, med mindre sorten udvikler sig langsomt i foråret og er vinterfast (f.eks. Informer). For sorter med svag efterårsvækst gælder det modsatte. Her bør man undlade sen såning (f.eks. Graham og Sheriff)«, siger Lars Bonde Eriksen.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug