



ANGREB AF SKADEGØRERE I MAJS, KARTOFLER OG SUKKERROER I REGISTRERINGSNETTET I UGE 32

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Beslutning om evt. svampebekæmpelse i majs skal træffes nu. Der er begyndende angreb af bederust i flere roemarkers.

BLADSVAMPE I MAJSHELSE

5. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majssemarksmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsseplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Angrebene er pt. overvejende svage både i de pløjede og upløjede marker.

Majsseplet: I 4 ud af 13 pløjede marker er der fundet majsseplet på bladet, der støtter kolben (10, 30, 70 hhv. 100 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben). I 5 ud af 6 upløjede marker er der fundet majsseplet på bladet, der støtter kolben (10, 10, 20, 25 hhv. 90 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben).

Der er også bedømt procent dækning af majsseplet på de 2 blade over hhv. under kolben. I de pløjede marker er angrebene svage, og der er bedømt 0-0,2 hhv. 0-0,1 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. I de upløjede marker er angrebene også relativt svage, men med kraftige angreb i en enkelt mark med 10 hhv. 65 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben.

Majsbladplet: I 2 ud af 13 pløjede marker er der fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben (5 hhv. 25 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben). I 2 ud af 6 upløjede marker er der fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben (10 hhv. 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben).

Der er også bedømt procent dækning af majsbladplet på de 2 blade over hhv. under kolben. I de pløjede marker er angrebene relativt svage, og der er bedømt 0-5 procent dækning på både de 2 blade over hhv. under kolben. I de upløjede marker er angrebene også relativt svage nemlig 0-2 hhv. 0-5 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben.

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt inden sprøjtefristen. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera. Anvend f.eks. 0,5 l Propulse eller 0,4 l Propulse + 0,15 Comet Pro.

Vækststadijerne varierer fra 63 til 71, så der skal nu træffes beslutning om evt. svampebekæmpelse i marker tæt på sprøjtefristen.

Se data på nedenstående link:

[Bladsvampe i majshelsæd](#)

MAJSHALVMØL

8. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er registreret på 15 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 3 lokaliteter i forskellige landsdele med hhv. 1, 1 hhv. 2 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Se data på nedenstående link:

[Majshalvmøl](#)

CIKADER I KARTOFLER

6. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 11 lokaliteter. Der findes kun få nymfer (0-2 pr. blad). De fleste marker er behandlet 2. gang med Mospilan.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år. Udviklingen ønskes fulgt en uge endnu, selv om de fleste nu har udført 2. og sidste behandling.

Se data på nedenstående link:

[Cikader, kartofler](#)

BLADSVAMPE I SUKKERROER

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer. Bederust er pt. mest udbredt.

Se data på nedenstående link:

[Bladsvampe i sukkerroer](#)