



OPGØRELSE AF ANGREB AF BLADTRIBBESNUDEBILLELARVER I REGISTRERINGSNETTET 2019

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der blev fundet relativ svage angreb. Kølgt vejr i foråret vurderes at have hæmmet æglægningen.

Forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps er igen i år fulgt i registreringsnettet fra medio marts til ultimo april via gule fangbakker på 46 lokaliteter.

Medio til ultimo maj er angrebsgraden af bladribbesnudebillelarver opgjort. Der er udtaget i alt 20 planter i de ubehandlede områder, hvor fangbakker har været placeret. Her er stænglerne flækket og undersøgt for bladribbesnudebillelarver. Se billeder nedenfor. Procent angrebne stængler er bedømt. For de angrebne stængler er yderligere bedømt antal larver pr. stængel. Såfremt der er udført en bekæmpelse, er angrebene også bedømt i et behandlet område. Angrebsgraderne ses i tabel 1. Hvis der kun er angivet en værdi ved ubehandlet, er denne lokalitet ikke blevet behandlet.

Ved enkelte lokaliteter blev der kun fundet spor efter larven og derfor er angivet "kun symptomer" i tabellen.


Det fremgår, at der på mange af lokaliteterne er fundet angreb af larver. Der er dog i de fleste tilfælde kun fundet relativ få larver pr. stængel. Det højeste fund var i gennemsnit 3-4 larver pr. stængel i de angrebne stængler. Angreb på 1-2 larver pr. stængel tillægges kun mindre betydning. Det kølige vejr i foråret vurderes at have hæmmet æglægningen.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, men det er vigtigt samtidig at vurdere temperaturforholdene, da antallet af æg pr. hun afhænger af temperaturen. Se yderligere i [Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps](#).

Tabel 1. Oversigt over fangster af bladribbesnudebiller i gule fangbakker og efterfølgende larveangreb på lokaliteterne i registreringsnettet i 2019. Larveangrebene er kun bedømt på angrebne stængler.


Center/lokalitet	Maks. antal bladribbesnudebiller pr. fangbakke pr. uge	Pct. angrebne stængler, bladribbesnudebillelarver		Larver pr. angreben stængel, ubehandlet
		Ubehandlet	Behandlet	
Bornholms Landbrug & Fødevarer				
Gudhjem	0	0		0
Aakirkeby Øst	0	0	0	0
Centrovic				
Bogense	7	40		1 til 2
Farstrup	3,5	55		1 til 2
Næsbyhoved Broby, Odense	10,5	65		Kun symptomer
Ullerup	7,5	45		Kun symptomer
Kolding Herreds Landbrugsforening				
Gelballevej, Kolding	0	10		3 til 4
Åstorp	0	25		1
LandboSyd				
Flensborgvej, Aabenraa	1	0		0
Højer mark	2	0		0
Landbrugsrådgivning Syd				
Gåsblok, Løgumkloster	3	0	0	0
Morud	0	0	0	0
Søndersø	0	0	0	0
Ubjerg, Tønder	0	0	0	0
LMO				
Bjerringbro	0	0		0
Hellum	54	0		0
Korning	0	0	0	0
Sejet	0	0		0
SAGRO				
Forumlund, Varde	0	0		0
Ny Lifstrupvej,	0	0		0


Varde				
Sønderjysk Landboforening				
Halk	0	0		0
Sillerup	0	5		Kun symptomer
Troldkær	3,5	0	0	0
Øster Højst	0	0		0
Vestjysk Landboforening				
Hee	2	0	0	0
Skjern	3	0	0	0
VKST				
Dalmose	5	10	0	0
Gyrsting	0,5	25		1
Horslunde	4	0	0	0
Hyllinge	4	10		3
Klodskov	0	0	0	0
Kongskilde	0	0		0
Lammestrup	0,5	10		Kun symptomer
Lungholm	0	0	0	0
Stenlille, mark 1	52	5		1
Stenlille, mark 2	38	15		1
Store Merløse	0	40		2 til 3
Tølløse	1	0		0
Vester Egesborg	0	2		1
Vipperød	2,5	0		0
Østerbøgebjerg, Skælskør	12	60		Kun symptomer
Østdansk Landboforening				
Forsøgsmarken, Karise	0,5	90		1 til 3
Mogenstrup, øst for Næstved	0,5	85		1 til 3





Billede 1. Planter undersøgt ved det ubehandlede område ved en af de gule fangbakker fotograferet 14. maj 2019 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.





Billede 2. Bladribbesnudebillelarve ved knivspidsen fotograferet 14. maj 2019 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Larven er lemmeløs med brunt hoved og ligger tit i c-form. Den er 4 mm i udviklet tilstand.



Billede 3. Bladribbesnudebillens larve og gnav i stængelmarven fotograferet 14. maj 2019 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.
