



1. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 38

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De første registreringer er foretaget. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er fundet bladlus i enkelte tilfælde i hvedemarkers sået ultimo august.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarkers og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

De første registreringer er foretaget. I hvede er der fundet bladlus i 3 (1, 1 hhv. 5 procent planter med bladlus) af 19 undersøgte marker. De 3 marker er sået 27.-28. august. I vinterbyg er der ikke fundet bladlus i 8 undersøgte marker.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet.

Se data og yderligere kommentarer:

[Vinterhvede](#)

[Vinterbyg](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

© 2021 - SEGES Projektsitet