



3. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 40

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er fundet enkelte bladlus i de nogle af de tidligst såede marker.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 12 af 24 marker (0,01-2 procent planter med bladlus). Markerne med bladlus er sået 27. august til 15. september. I vinterbyg er der kun fundet bladlus i 8 af 16 marker (0,5-2 procent angrebne planter). Markerne med bladlus er sået 1. september til 10. september.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med tidligere år. I efteråret 2017 blev der ikke foretaget registreringer i vinterbyg.

Se data og yderligere kommentarer:

Vinterhvede

Vinterbyg



