



4. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 41

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet bladlus over bekæmpelsestærsklen i nogle tidligt såede marker.

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået fra slutningen af august til 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 16 af 29 marker (0,5-10 procent planter med bladlus). I vinterbyg er der fundet bladlus i 10 af 20 marker (0,5-5 procent angrebne planter).

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Pt. er der fundet 2-3 procent angrebne planter eller flere i 7 hvede- og 4 vinterbygmarker.

Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet.

Undersøg vintersædsmarkerne for evt. bladlus. Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med tidligere år. I efteråret 2017 blev der ikke foretaget registreringer i vinterbyg.

Se data og yderligere kommentarer:

- Vinterhvede
- Vinterbyg



