



7. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 44

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes nu at være truffet. Bekæmpelse i november vurderes generelt ikke nødvendigt i år i marker, hvor der kun er angreb omkring bekæmpelsestærsklen.

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået fra slutningen af august til 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 19 af 30 marker (0,01-8 procent planter med bladlus). I vinterbyg er der fundet bladlus i 11 af 18 marker (0,01-5 procent planter med bladlus).

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. I forsøg døde halvdelen af havrebladlusene ved $\div 0,5^{\circ}\text{C}$, mens halvdelen af kornbladlusene først døde ved $\div 8^{\circ}\text{C}$. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. I denne uge er der fundet 2-3 procent angrebne planter eller flere i 11 af hvedemarkerne og 7 af vinterbygmarkerne.

Undersøg vintersædsmarkerne for evt. bladlus. Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Til bekæmpelse kan anvendes 0,1-0,15 kg Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac eller 0,05-0,1 l Mavrik Vita og i

vinterbyg yderligere 0,1-0,15 l Biscaya pr. ha.

Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes nu at være truffet. Bekæmpelse i november vurderes generelt ikke nødvendigt i år i marker, hvor der kun er angreb omkring bekæmpelsestærsklen. Dette skyldes, at tærsklen er lavt sat og at tiden til at få spredt virus nu er kortere.

Overordnet set er angrebene pt. relativt lave. I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med tidligere efterår. I efteråret 2017 blev der ikke foretaget registreringer i vinterbyg.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Se data og yderligere kommentarer:

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterbyg](#)



