



8. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 45

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Sidste registrering er foretaget. Bekæmpelse i november er kun undtagelsesvis aktuel.

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået fra slutningen af august til 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 11 af 28 marker (0,5-8 procent planter med bladlus). I vinterbyg er der fundet bladlus i 10 af 17 marker (0,01-4 procent planter med bladlus).

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. I forsøg døde halvdelen af havrebladlusene ved $\div 0,5^{\circ}\text{C}$, mens halvdelen af kornbladlusene først døde ved $\div 8^{\circ}\text{C}$. Finder man dog i september - oktober bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. I denne uge er der fundet 2-3 procent angrebne planter eller flere i 6 af hvedemarkerne og 4 af vinterbygmarkerne.

Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes nu at være truffet. Bekæmpelse i november vurderes generelt ikke nødvendigt i år i marker, hvor der kun er angreb omkring bekæmpelsestærsklen. Dette skyldes, at tærsklen er lavt sat og at tiden til at få spredt virus nu er kortere.

Overordnet set er angrebene i år relativt lave. I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med tidligere efterår. I efteråret 2017 blev der ikke foretaget registreringer i vinterbyg.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Se data og yderligere kommentarer:

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterbyg](#)



