



5. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER 23.-24. SEPTEMBER 2019

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 35 procent af markerne. Bekæmpelse kan udføres fra nu af i de længst udviklede marker. Hold også øje med evt. larver af den nye generation kålbladhvæpse.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 65 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. I år er rapsen bejdset med midler med begrænset effekt mod skadedyr eller ubejdset, så man skal være ekstra opmærksom på evt. bladgnav. Der er i flere marker meldt om bekæmpelsesbehov rettet mod de voksne rapsjordlopper. Bladgnav kan skade planterne frem til at ca. 4 løvblade er udviklet. Såning er sket over en lang periode, og der er stor spredning på rapsens udvikling.

I Tyskland anbefales bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordlopper på varme dage, hvor rapsjordlopperne er mere aktive og ikke gemmer sig under jordknoldene. Effekten af behandling opnås både ved at ramme rapsjordlopperne og ved at jordlopperne æder af behandlede blade. Virkningstiden af sidstnævnte er dog kort, da tilvæksten af blade er stor i de tidlige vækststadier, og der anvendes kontaktmidler.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Der har i den forløbne uges varme og solrige vejr været en tydelig stigning i forekomsten af rapsjordlopper i fangbakkerne. Der er registreret rapsjordlopper på ca. 85 procent af lokaliteterne og med op til 46-62 rapsjordlopper pr. fangbakke pr. uge. Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 35 procent af markerne.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra at alle planter i marken har 4-5 løvblade. Bekæmpelse rettet mod larver kan derfor udføres fra nu af i de længst udviklede marker.


Vækststadiet varierer fra 11 til 19 (1-9 løvblade udviklet).

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.

I Slesvig Holsten opfordrer de også til at holde øje med evt. angreb af en ny generation kålbladhvæpse, da de i de gule fangbakker på nogle lokaliteter i den forløbne uge har fundet mange kålbladhvæpse. [Se udseende af voksne kålmøl og larver her](#). Æggene klækker afhængig af temperaturen 4-12 dage efter æglægning.

Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2014-2019. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2014-2019. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

