



6. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER 30. SEPTEMBER OG 1. OKTOBER 2019

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i 45 procent af markerne.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 65 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjord-lopper i fremspiringsfasen. Bladgnav kan skade planterne frem til at ca. 4 løvblade er udviklet.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjord-lopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Æglægningen begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.


Der er denne uge registreret op til 28 rapsjordlopper pr. fangbakke pr. uge. Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 45 procent af markerne.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra at alle planter i marken har 4-5 løvblade. Bekæmpelse rettet mod larver kan derfor udføres nu i mange marker.

Vækststadiet varierer fra 11 til 19 (1-9 løvblade udviklet).

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2014-2019. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentarer](#).