



8. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER 14 - 15. OKTOBER 2019

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 45 procent af markerne.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 65 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.


Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Æglægningen begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Aktiviteten er nu aftagende. Der er denne uge registreret op til 6-8 rapsjordlopper pr. fangbakke pr. uge. Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 45 procent af markerne, hvilket er på niveau med de foregående 2 uger.

Til bekæmpelse anbefales 0,2 kg Karate eller 0,1 kg Kaiso Sorbie.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2014-2019. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentarer](#).