



10. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER 28 - 29. OKTOBER 2019

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Sidste registrering er foretaget. Hvis det ikke har været muligt at færdes i marken, kan der stadig opnås væsentlig effekt i november.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 65 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers *larver*.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden.

Aktiviteten er på et lavt niveau. Der er denne uge registreret op til 5-8 rapsjordlopper pr. fangbakke pr. uge. Der er i år udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 45 procent af markerne.


Til bekæmpelse anbefales 0,2 kg Karate eller 0,1 kg Kaiso Sorbie.

Bekæmpelse af rapsjordlopper skal nu afsluttes. Bekæmpelse i oktober tilstræbes, men hvis det ikke har været muligt at færdes i markerne grundet megen nedbør, kan bekæmpelse under milde forhold stadig udføres i november med væsentlig effekt, såfremt det er muligt at køre.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2014-2019. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentarer](#).