



2. REGISTRERING AF LYS BLADPLET OG BLADTRIBBESNUDEBILLER I VINTERRAPS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet lys bladplet i 2 ud af 35 marker.

LYS BLADPLET

Der er bedømt i 35 marker, og der er fundet svage angreb af lys bladplet i 2 af markerne (1 procent angrebne planter). Evt. bekæmpelse anbefales fra begyndende strækning og ved min. 5 procent angrebne planter. Der skal også være vækst i afgrøden.

Fra praksis er der modtaget meldinger om svage angreb flere steder på Fyn, ved Juelsminde, Randers og Haderslev.

Lys bladplet fremmes af fugtige og kølige forhold. Infektion kan ved fugtige forhold og 5-15° C ske indenfor 5 dage.

BLADTRIBBESNUDEBILLER

Første aflæsning af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er foretaget. Fangbakkerne har været udsat i rapsmarkerne i den forløbne uge, og indholdet er aflæst 11.-12. marts.

Der er pt. aflæst fangster på 36 lokaliteter. Der er kun fundet bladribbesnudebiller på 2 lokaliteter og kun små forekomster (0,5-1 bladribbesnudebille/fangbakke). Det har været køligt i den forløbne uge. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12° C. Først ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15°C og mere end 3 timers solskin optræder bladribbesnudebillerne mere talrigt.

Se detaljerede data under [varslings/registreringsnet](#).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

© 2021 - SEGES Projektsitet