



4. REGISTRERING AF LYS BLADPLET OG BLADTRIBBESNUDEBILLER I VINTERRAPS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet lys bladplet over bekæmpelsestærsklen i 3 ud af 36 marker. Der er stor variation i angrebene, så undersøg markerne nu.

LYS BLADPLET

4. registrering af lys bladplet i vinterraps er foretaget. Der er bedømt i 36 marker, og der er fundet angreb af lys bladplet i 11 af markerne, men overvejende med svage angreb. Der er fundet angreb over bekæmpelsestærsklen i 3 marker (10, 30 hhv. 80 procent angrebne planter), dvs. i 8 procent af markerne. Evt. bekæmpelse anbefales under strækningen ved min. 5 procent angrebne planter.

Fra praksis er der også modtaget meldinger om angreb i flere marker i flere landsdele og oftest svage angreb, men der er også meldinger om marker med mere udbredte angreb.

LMO har i den forløbne uge undersøgt 31 vinterrapsmarker for evt. angreb og fundet stor variation mellem markerne og har også fundet tilfælde af ret udbredte angreb. Der er fra hver af markerne udtaget 20 blade til bedømmelse, men først fra den kommende uge bedømmes også procent angrebne planter.

Det er vigtigt at tjekke markerne for evt. angreb. Lys bladplet trives bedst under fugtige forhold (mindst 17 timers vedvarende bladfugt er nødvendig for infektion) og 5-15°C. Inkubationstiden (tiden fra smitte til nye angreb ses) er ca. 170 graddage, dvs. nye angreb vil ses efter 17 dage, hvis gennemsnitstemperaturen er 10 grader ($170:10 = 17$ dage). Smitte som følge af den tidligere megen nedbør viser sig nu.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4 l/ha Folicur Xpert. 0,4 l Prosaro kan også anvendes, såfremt

der også er angreb af andre svampesygdomme (gråskimmel, skulpesvamp), da Prosaro ikke er godkendt mod lys bladplet.

BLADTRIBBESNUDEBILLER

3. aflæsning af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er foretaget. Fangbakkerne har været udsat i rapsmarkerne i den forløbne uge, og indholdet er aflæst 25.-26. marts.

Der er aflæst fangster på 45 lokaliteter, og der er ikke fundet bladribbesnudebiller på nogen af lokaliteterne. Køligt vejr er ugunstigt for bladribbesnudebiller. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12° C. Først ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15°C og mere end 3 timers solskin optræder bladribbesnudebillerne mere talrigt.

Se detaljerede data under [varsling/registreringsnet](#).






Billede 1. Lys bladplet fotograferet 25. marts 2019 af Nikolaj Østergård Wagner, Landbo Limfjord.



Billede 2. Lys bladplet fotograferet 25. marts 2019 af Nikolaj Østergård Wagner, Landbo Limfjord.





Billede 3. Lys bladplet fotograferet 26. marts 2019 af Mads Brandt, Landbrugsrådgivning Syd.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.