



AKSLØBERLARVER AKTIVE I VINTERSÆD OG FRØGRÆS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det milde vejr har medført, at larverne er mere aktive end normalt. Larverne er mindre udbredte i landet, men kan gøre stor skade.

Der er i de seneste uger meldt om nogle tilfælde af angreb af aksløberlarver i vintersæd. Angreb af aksløberlarver er mindre udbredte i landet, men angreb er de senere år set flere og flere steder. Angreb ses især i milde områder med megen frøgræs. De voksne aksløbere er dårlige flyvere og angreb ses derfor tit i de samme områder.

Larverne i de angrebne marker er nok mere aktive i år grundet den milde vinter. Skaden kan fortsætte ind i maj måned, og både korn, græsser og til tider majs kan angribes.

Larverne æder af bladene, som ofte kan få et trevlet udseende. Det er også typisk, at larverne trækker bladene ned i jorden for at æde af dem. Små jordhobe, som larverne har kastet op, ses også, men ved hyppig regn som i år, "forsvinder" disse jordhobe hurtigt igen.

Skaden "grundlægges" i august-september, hvor den voksne aksløber lægger æg i stubmarker med spildkornsplanter og græs eller lægger æg direkte i frøgræs eller nysået vintersæd. Stubbearbejdning før æglægningen begynder vurderes at kunne nedsætte skaden, hvor æglægning sker i stub. Før forårssåede afgrøder er det som bekendt ikke lovligt at udføre jordbearbejdning i august-september. SEGES har tidligere uden held forsøgt at få tilladelse til jordbearbejdning i marker med angreb af aksløbere.

Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af aksløberlarver efterår og forår fra 1. marts i græs, kløvergræs, frøgræs og korn. Der må benyttes 0,45 l/ha, og der må maks. behandles 1 gang om efteråret og 1 gang om foråret. Avaunt virker som en ædegift, dvs. ved at larverne æder af blade behandlet med Avaunt. Det gælder således ikke om at ramme larverne.

En forudsætning for god effekt er derfor, at larverne er aktive og æder blade. I områder uden planter kan der således ikke længere opnås effekt. Tilbagemeldinger fra praksis med bekæmpelse i efteråret viser relativ god effekt med 0,3 l Avaunt 150 EC.

Se yderligere fotos af angreb samt beskrivelse af aksløberens biologi i [Biologi og bekæmpelse af aksløberens larve](#).



Billede 1. Triticalemark angrebet af aksløberlarver fotograferet 11. februar 2020 af Lone Amdi Sejersen, Velas. Angrebene startede sidst i november og begyndelsen af december. Nu er marken stort set ryddet af larverne.



Billede 2. Aksløberlarver. Foto: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.

© 2021 - SEGES Projektsitet