

## ANGREB AF STANKELBENLARVER

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Majs er mest robust mod angreb.

Den senere tid er modtaget nogle meldinger om angreb af stankelbenlarver.

Stankelbenene lægger æg i græs i august til primo september, så skaden grundlægges, hvis der har været græs på dette tidspunkt.

Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Larvernes aktivitet ophører omkring 1. juni, hvor evt. omsåning kan udføres dog kan majs sås allerede nu. Stankelben forpupper sig normalt omkring Sankt Hans, og aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Grundet det milde efterår og vinter forpupper larverne sig nok lidt tidligere i år, så der kan omsås fra omkring 1. juni.

Larverne angriber alle afgrøder, men majs er mest robust. Ært/hestebønner er næstmest robuste.

Stankelben kan bedre lide vårbyg end havre, men hvis der kun er havre, vil denne også blive angrebet, men i mindre omfang end vårbyg.

Normalt findes der flest stankelben i 2. og 3. års græsmarker, der har været afgræsset. Larverne er mest udbredt på humus-, sand- og marskjorder.

I år har der været solgt majsudsæd bejdset med Sonido (thiaclopid), men dette er udsolgt, og bejdsen må ikke bruges fremover. Midlet har nogen effekt på både smelder- og stankelbenlarver.

Se også [Bekæmpelse af stankelbenlarver](#).





**Foto 1.** Angreb af stankelbenlarver i vårbyg sået direkte efter rajgræs fotograferet 6. maj 2020 af Kasper Holm Kristensen, Velas.



**Foto 2.** Angreb af stankelbenlarver i vårbygmark efter græs (foto fra tidligere år). Bemærk, at der er mindre angreb i forageren, hvor jorden er mere fast. Tromling kan dog desværre oftest ikke give samme effekt.