

Planter

Kålbladhvepselarver i raps og olieræddike

Ved kraftige angreb kan der være behov for bekæmpelse i raps.

Viden om Opdateret Kl. 07:55



Der er de seneste dage meldt om angreb af 2. generation kålbladhvepselarver i nogle rapsmarker. Pt. er der ikke modtaget meldinger om angreb i olieræddike, men i 2019 var der også angreb i marker med efterafgrøder af olieræddike. Se billeder.

Larverne kan ved kraftige angreb helt afløve bladene. Angreb kan optræde i hele marken, men kan også begynde i markkanten, hvis der er høstede nabomarker med raps, hvorfra kålbladhvepselarverne "indvandrer".

Larverne er først lysegrå til lysegrønne, men bliver senere mørkegrønne eller sorte med en fløjlsagtig overflade. Siderne og undersiden er grå. Larven bliver knap 2 cm. Æggene lægges i små lommer på bladene. Larverne af 1. generation er fremme i maj-juni, men er oftest uden betydning. Larverne af 2. generation er fremme i slutningen af juli til hen i september. Under varme forhold kan der udvikles en 3. generation senere i efteråret.

Ingen af de godkendte midler har nævnt kålbladhvepse på etiketten, men Lamdex/Karate og Kaiso Sorbie kan benyttes i raps, såfremt der samtidig er behov for bekæmpelse af rapsjordlopper. Da larverne er relativ store, vurderes det, at der skal anvendes normal dosis, dvs. 0,2 kg/ha Lamdex/Karate og 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie.

Meldinger om evt. angreb modtages gerne.

Regler for de forskellige efterafgrødetyper

For at efterafgrøder kan godkendes i en kontrol skal de overholde kravet til dækningsgrad jf. trappemodellen i tabel 1 (gælder både MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder)

Tabel 1. Forventet trappemodell for kontrol af efterafgrøder i efteråret 2020

Periode, hvor kontrollen gennemføres	Seneste såtidspunkt for efterafgrøder (Mindstekrav til dækning)			
	20. august	24. august Kontrolårsag 4	28. august Kontrolårsag 5	7. september Kontrolårsag 7
11/9 - 14/9	15%	0%*	0%*	0%*
15/9 - 20/9	20%	5%	0%*	0%*



Periode, hvor kontrollen gennemføres	Seneste såtidspunkt for efterafgrøder (Mindstekrav til dækning)			
21/9 - 25/9	25%	10%	0%*	0%*
26/9 - 1/10	30%	15%	5%	0%*
2/10 - 6/10	35%	20%	10%	0%*
7/10 - 28/12	40%	25%	15%	10%

*Der skal dog være synlige tegn på etablering af efterafgrøder i form af f.eks. udsæd eller fremspiring.

MFO-efterafgrøder

Der er generelt forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler fra såtidspunktet til destruktionsfristen for MFO-efterafgrødeblandinger. For MFO-græsudlæg gælder forbuddet fra høst af hovedafgrøden og frem til destruktion.

Reglerne giver mulighed for, at der i helt særlige tilfælde kan søges om force majeure, hvis efterafgrøderne ikke overholder kravet til dækning. Landbrugsstyrelsen er generelt meget restriktive i forhold til at give force majeure ved angreb fra skadedyr.

Force majeure er givet i de tilfælde, hvor styrelsen har vurderet, at landmanden har gjort hvad han/hun kunne, og at årsagen har været helt ekstraordinær og uforudsigelig. Force majeure skal søges senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor landmanden har konstateret problemet.

Pligtige-, husdyr-, og målrettede efterafgrøder

Der er her ikke forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, men kun Lamdex/Karate 2,5 WG har en mindre anvendelse og kun mod skulpesnudebiller om efteråret i olieræddike til efterafgrøde. SEGES undersøger dog pt. om den mindre anvendelse for Lamdex kan udvides til også at omfatte kålbladhvepse i olieræddike til efterafgrøde.

For pligtige- og husdyrefterafgrøder er der ikke mulighed for force majeure. Hvis ikke dækningskravet kan overholdes, bør efterafgrøden afmeldes senest 10. september, og i stedet kan efterafgrødekravet opfyldes med opsparede efterafgrøder eller nedsat N-kvote.

I reglerne for målrettede efterafgrøder gives der mulighed for force majeure, men SEGES har ikke hørt om der er givet force majeure i forhold til angreb af skadedyr.




Billede 1. Angreb af kålbladhvepselarver i tidligt sået raps fotograferet 25. august 2020 af Poul Madsen, Agrinord.





Billede 2. Angreb af kålbladhvepselarver i tidligt sået raps fotograferet 25. august 2020 af Poul Madsen, Agrinord.



Billede 3. Kålbladhvepselarver og gnav i olieræddike fotograferet 26. august 2019 af Kristian Petersen, LHN.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne: [Klik her](#)

Emneord

[Efterafgrøder](#)[Foder-/olieræddike](#)[Raps](#)[+3](#)

Sidst bekræftet/revideret: 27. august 2020

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439



Marianne Haugaard-Christensen

Landskonsulent, cand.agro.

SEGES

mhg@seges.dk

+45 8740 5403



Støttet af

STØTTE AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

