

BLADRANDBILLER I HESTEBØNNER OG ÆRTER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Bekæmpelse har til formål at begrænse larveangreb på rodknolde og rødder.

De første meldinger om angreb af bladrandbiller i ærter og hestebønner er modtaget de seneste dage. Se fotos.

Bekæmpelse kan være aktuel i de tidligste vækststadier ved i gennemsnit 1 gnav pr. plante.

Der er i hestebønner kun udført 3 forsøg med bekæmpelse af bladrandbiller, men i indeværende år er anlagt flere landsforsøg med bekæmpelse.

I ærter er der udført 34 landsforsøg i 1992-97 med bekæmpelse af bladrandbiller. Ca. 55 procent af forsøgene har været rentable ved 160 kr pr. hkg ærter. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte var 0,8 hkg/ha (højeste bruttomerudbytte 4,9 hkg/ha). Der har således ikke været tale om meget store merudbytter ved bekæmpelse

Til bekæmpelse i hestebønner og ærter kan anvendes 0,1 kg Lamdex/Karate 2,5 WG. Lamdex erstatter Karate 2,5 WG, som det er forbudt at anvende og opbevare pr. 1/7 2021. I ærter kan yderligere anvendes 0,15 l Fastac eller 0,1 l Mavrik Vita. Der anbefales lave doser, fordi der grundet den hurtige vækst alligevel ikke kan opnås nogen lang virkningstid med pyrethroider (kontaktmidler).

Bekæmpelse har til formål at begrænse larveangreb på rodknolde og rødder. Bladgnavene tillægges kun mindre betydning. Hvis bekæmpelse først udføres længe efter de første angreb, bliver der således tale om en "hævnspøjning".





Foto 1. Gnav fra bladrandbille på hestebønner fotograferet 27. april 2020 af Kasper Holm Kristensen, Velas.



Foto 2. "Billetklip" fra bladrandbiller på hestebønner fotograferet 27. april 2020 af Kasper Holm Kristensen, Velas.



Foto 3. Bladrandbille på jordoverfladen fotograferet 27. april 2020 af Kasper Holm Kristensen,

Velas. Bladrandbillen er ca. 5 mm.



Foto 4. Angreb af bladrandbillelarver på rodknolde af hestebønner i tidligere år.