

[< Tilbage](#)

Planter

Hæmmet vækst i vårbyg efter græs

Der vurderes at være tale om en forgiftning fra stoffer udskilt ved omsætning af græsset.

Analyse | 19. juni 2020



Den senere tid er modtaget flere henvendelser om dårlig vækst i vårbyg efter græs. Se billede 1-2.

Områdevis i små eller større pletter i marken ses meget skarpt afgrænsede områder med stærkt hæmmet vækst. En nærmere undersøgelse af planterne har ikke vist angreb af havrecystenematoder eller andre skadegørere. Jordprøver fra pletterne viser ikke mangel på næringsstoffer. Det ligner heller ikke næringsmangel, da pletterne ikke er udflydende men skarpt afgrænsede.



Billede 1. Stærkt hæmmet vækst i vårbyg efter græs fotograferet den 15. juni 2020 af Kirsten Friis Vestergaard, Velas.



Billede 2. Nærbillede af hæmmede planter på foto 1 fotograferet den 15. juni 2020 af Kirsten Friis Vestergaard, Velas.

Der vurderes at være tale om en forgiftning fra stoffer (phenoler m.fl.) udskilt ved omsætning af græsset og kaldes også "græssyge". Dette ses mere tydeligt i tørre år og ses især på let jord og ved sen pløjning af græsset. Erfaringer fra praksis viser, at nedvisning eller nedmuldning af græssværen



tidligt forår reducerer problemet.

Emneord

Frøafgrøder

Grovfoder

Kløver

+3

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439



Torben Spanggaard Frandsen

Specialkonsulent, Grovfoder

SEGES P/S

tsf@seges.dk

+45 8740 6660

Støttet af

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf.

87 40 50 00

Fax.

87 40 50 10

Email

info@seges.dk

