



HESTEBØNNESORTERS MODTAGELIGHED FOR VIKKESKIMMEL

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug


Der er ret store forskelle på sorternes modtagelighed

I tabel 1 ses en oversigt over hestebønnesorters modtagelighed for vikkeskimmel fra den engelske PGRO Recommended List 2020. Der er ikke angivet modtagelighed for andre svampesygdomme.

Sort	Modtagelighed 0-9 skala, hvor 9 er mest resistent
Lynx	7
Macho	4
LG Raptor	4
Ghengis	4
Fanfare	5
Vertigo	6
Mallory	7
LG Cartouche	4
Fuego	5
Yukon	8
Victus	6
Tiffany	4

Det fremgår, at der tilsyneladende er ret store forskelle på sorternes modtagelighed, og at Yukon, Lynx og Mallory er de mindst modtagelige af de angivne sorter.

I figur 1 ses sammenhæng mellem dækning af vikkeskimmel på blade i forskellige sorter i observationsparceller ved Nordic Seed og karakter for modtagelighed jævnfør PGRO. Det fremgår, at der er rimelig god overensstemmelse mellem de bedømte angrebsgrader i sorter hos Nordic Seed og PGRO's data.



Figur 1. Sammenhæng mellem dækning af vikkeskimmel på blade i forskellige hestebønnesorter i observationsparceller ved Nordic Seed og karakter for modtagelighed jævnfør det engelske PGRO (0-9 skala, hvor 9 er bedste resistens).



Billede 1. Angreb af vikkeskimmel.

© 2021 - SEGES Projektsitet