



## ER DER GODT GANG I VÅRBYGGEN, OG SKAL DER VÆKSTREGULERES?

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug

Vårbyggen har generelt busket sig rigtig godt i år, og lige nu er det meget forskelligt hvor langt afgrøderne er i udviklingen, vækststadiene varierer fra st. 31- 37 (1. knæ mærkbart – spids af faneblad synligt).

Vækststadie 31-33 (1.-3. knæ mærkbart) er et godt tidspunkt til vækstregulering. Tag følgende forhold i betragtning, som øger risikoen for lejesæd:

- Afgrøden er meget kraftig
- Der er anvendt en høj kvælstofmængde i f.eks. gylle
- Sort med lav stråstyrke
- Jorden har en god vandholdende evne, f.eks. humusjorde

De sorter der har mindst stråstyrke er: Laureate, Laurikka og Chanson. Til gengæld er de mest ståstive sorter KWS Irina og Feedway.

Vækstregulering i st. 31-33 (1.-3. knæ mærkbart) har ikke effekt på nedknækning, det har derimod en behandling med Cerone eller Terpal i vækststadium 37-45 (spids af faneblad synligt – fanebladets bladskede opsvulmet) Svampesprøjtning reducerer også risikoen for af aks- og strånedknækning. Cerone og Terpal bør ikke blandes med ukrudtsmidler.

Undlad brug af vækstreguleringsmidler i afgrøder som har afgrødestress af den ene eller anden årsag, f.eks. vandmangel, eller høje temperaturer. Ved høje temperaturer virker midlerne kraftigere, og Cerone og Terpal anbefales ikke anvendt ved temperaturer over 22-23 grader.

Læs mere i artiklen: [Vækstregulering samt forebyggelse af aks- og strånedknækning](#)

