



HUSK AT TJEKKE FLYVETIDSPUNKTET FOR BYGFLUER I VÅRHVEDE

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Afhængig af landsdel forventes pt. begyndende flyvning fra omkring medio maj til omkring 1. juni.

I forårssået vårhvede kan det være aktuelt at bekæmpe bygfluer, når flyvningen starter. Se yderligere i [Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede](#).

Der findes en temperaturmodel, der angiver flyvning af bygfluer ved 300 graddage med basis 4,5 °C. Graddage kan beregnes på [Graddageberegner](#). Der skal kun indtastes 300 graddage (tærskelværdi), basis 4,5° C og 0,7 °C for klimaændringer samt bynavn. Herefter trykkes beregn, og med rødt vises datoen for begyndende flyvning på den pågældende lokalitet. Jo tættere man kommer på flyvetidspunktet jo mere sikker bliver modellen. Dette skyldes, at der i starten benyttes normaldata for temperatur, men efterhånden som data foreligger, benyttes de aktuelle temperaturdata.

Eksempelvis kan aflæses, at der ved Maribo pt. forventes begyndende flyvning den 19. maj og ved Brønderslev først den 1. juni.