



UKRUDT MED LØVBLADE ER SVÆRT AT BEKÆMPE MED STRIGLEN UDEN STOR AFGRØDESKADE

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det kolde og tørre forår har gjort det svært at opnå en god effekt af blindstriglingen, da ukrudt og afgrøde er spiret frem på stort set samme tid. Derfor er det ekstra vigtigt at have styr på ukrudtsharvningen i år.



Ukrudtets størrelse bestemmer effekten af strigling. Kun ukrudt under fremspiring eller senest med kimblade, kan bekæmpes effektivt uden for stor skade på afgrøden.

I det kolde og tørre forår, som der har været i år, er ukrudtet spiret fra større dybde end

sædvanligt. Normalt spirer det meste af ukrudtet fra de øverste 2-3 cm, men i år er meget af ukrudtet kommet fra 4-5 cm dybde. Mange ukrudtsarter, herunder agerkål, agersennep og hvidmelet gåsefod, spirer også fra 4-6 cm dybde, og vil derfor også dukke op i år - bare lidt senere.

Det betyder, at det har været svært at opnå en god effekt af blindstriglingen, da både afgrøde og ukrudt er spiret frem med få dages mellemrum, og vinduet til blindstrigling har derfor været meget kort.

VED UKRUDTSHARVNING I KORN OG BÆLGSÆD GÆLDER

- Ukrudt med løvblade vil ofte kræve en så aggressiv ukrudtsharvning (større tandtryk og hastighed), at det beskadiger afgrøden mere end det gavner
- Gå i stedet efter at ramme ukrudtsspirer og ukrudtskimplanter (se foto)
 - Tilpas hastighed og trykket på harvetænderne til at ramme ukrudtsspirer og ukrudtskimplanter
- Korn på 1 til 1½ blads stadiet er mest følsomt overfor tildækning, i de senere stadier kan det tåle mere
 - Kør langsomt og med et let tryk, så du ikke tildækker og svækker for stor en del af afgrøden, når kornet er på 1 til 1½ blads stadiet
- Bælgsædsspirer kan lige under fremspiring risikere at knække ved strigling. I de senere vækststadier kan den tåle en mere kraftig ukrudtsharvning



Det er de små og spæde ukrudtskimplanter, der kan bekæmpes med størst effekt og mindst afgrødeskade. Fotograf: Tomas F. Nørfeldt, SEGES