



KÆMPETRÆHVEPS

Kæmpetræhvepsen kan blive næsten 4 cm lang. Når den kommer flyvende, kan den virke frygtindgydende med sin enorme brod. Men der er intet at frygte, for brodden bruges kun til at lægge æg med! Æggene blive stukket dybt ind i veddet på træer, der allerede er døde eller svækkede. Herefter spiser larverne langsomt deres vej ud, inden de udvikler sig til voksne træhvepse.



SKOVJÆGER

Skovjæger er en lille edderkop på bare 5 mm med en lys stribet forkropp. I modsætning til f.eks. krydederkopper, der sidder stille i sit spind, er skovjægeren en aktiv jæger, der løber rundt for at opsøge sit bytte. Den er især knyttet til ældre løvskove, der indeholder masser af gamle og udgåede træer. Her løber den rundt på stammer og grene, på jagt efter sit næste måltid.



RØD MURERBI

Rød murerbi er omkring 1 cm lang, og kan kendes på sin tæt behårede, orange bagkrop og det sorte hoved. I modsætning til honningbier, som lever i store kolonier, er rød murerbi en ægte eneboer. Den lever sin rede alene, helst i huller, som er efterladt af andre insekter, fx piletrorer, kæmpetræhveps og tømmerrmand. Hvis der er mangel på gamle træer med egnede huller, kan den dog også bruge finde på at flytte ind i de menneskeskabte insekthoteller, som mange har i haven.




TØMMERMAND

Tømmerrmanden er en bille med enormt lange følehorn. Hans følehorn kan blive op til 5 gange dens egen kropslængde, og bruges til at imponere hunnerne ned. Den flotte tømmerrmand er sjældn i Danmark, men man kan være heldig at finde den i fyrreskove eller på tømmerpladser. Det er nemlig i barken på nyligt døde skovfyr, at hunnen lægger sine æg.



GRÅ BÆNKEBIDER

Vidste du, at bænkebidere er krebsdyr ligesom hummere og rejer? Hvis du kigger godt efter, kan du faktisk se, at en bænkebidere, med sin skællædte krop, ligner sine vandlevende slægtninge. Selvom bænkebidere har tilpasset sig et liv på land, kan de ikke tåle at tørre ud. Derfor gemmer de sig helst på fugtige steder, som under barken på våde, rådne stammer, der får lov til at ligge i skovbunden.



NÆSEHORNSBILLE

Næsehornsbillen er en kraftigt bygget bille på helt op til 4 cm. Hannerne kendes let på det flotte, lange "næsehorn"-horn. Larven lever i døde stammer, men findes også af og til i flisbunker og grenstakke. Det tager mellem 3-5 år for larven at udvikle sig til en voksen bille. Derfor er næsehornsbillen meget afhængig af døde træer, der får lov at stå eller ligge i lang tid.



DAGPÅFUGLEØJE

Dagpåfugleøje er en flot sommerfugl med mørkerød overside og karakteristiske 'øjepletter' på vingerne, som de fleste kender fra haven. Om vinteren går de voksne sommerfugle i hi i hule træer eller under løvtræbark. Er der mangel på gamle træer, kan den dog også finde på at overvinde i bygninger eller brændestabler. Hvis dagpåfugleøje forstyrres i sin vintersøvn, kan den give en uhyggelig hvæsende lyd, som laves ved at gnide vingerne hurtigt mod hinanden, og som er beregnet til at skræmme sultne mus eller andre fjender væk.



SYVPLETTET MARIEHØNE

Der findes mange forskellige arter af mariehøns, hvoraf den mest almindelige er den 5-8 mm store syvplettede mariehøne. De fleste arter af mariehøns er rovdyr og lever af andre insekter, fx bladlus. De betragtes derfor som nyttedyr i f.eks. landbruget. Om vinteren går mariehønsene i vinterdvale, f.eks. under løv på træer, hvor de undertiden kan træffes i meget store mængder. Her lever de af deres opsørgede fedtreserver, mens de venter på de første varme solskinsdage om foråret.



PILEBORER

Pileborer er en stor, naktaktiv sommerfugl. Den voksne sommerfugl lever kun i ganske få dage, hvor den bruger al sin tid på at parre sig og lægge æg. Størstedelen af sit liv tilbringer den som larve, hvor den lever af træved. Efter 2-3 år kravler den kæmpestore larve, som i mellemtiden er blevet 10 cm lang, mørkerød og tyk som en finger, ud for at forpuppe sig. Derfor kan man i sensommeren være heldig at støde på larven, også kendt som 'rørdorm', når den kravler rundt på jorden. Man pas på! Til forsvar kan larven levere et meget kraftigt bid.



LØVTRÆSMYREBILLEN

Løvtræsmyrebilen er en lille bille, der lever af at jage andre vedboende billearters larver, i deres gange under barken. Derfor findes den kun i skove som er rige på udgåede grene og stammer fyldt med billelarver. Er du så heldig at støde på en løvtræsmyrebille er det altså et godt tegn på, at der er masser af myldrende insekter i træerne omkring dig.



FIND ARTER MED TELEFONEN

App'en iNaturalist kan hjælpe dig med at sætte navn på de dyr og planter du finder i naturen. Tag billeder eller optag dyreløyd med din telefon – og du får et bud på, hvad det er for en art. Hvis du har lyst, kan du også dele dine observationer med andre. Dine data kan også bruges i forskningen af arternes udbredelse.

DØDE TRÆER ER FULDE AF LIV!

Vidste du, at et gammelt, råddent og nedbrudt træ er ligeså fyldt med liv, som da træet stadig levede? Rådne grene, hule stammer, sprækker og vandsamlinger er fremragende levesteder for mange hundrede forskellige arter af insekter og andre smådyr. Når smådyrene flytter ind i de gamle træer, skaber de samtidig levesteder for et mylder af andet liv, f.eks. småfugle, spætter, flagermus, mosser og svampe. Når vi fjerner gamle og døde træer fra landskabet, fjerner vi også disse unikke levesteder. Derfor er det vigtigt at passe på dem! Her kan du møde nogle af de smådyr, der er knyttet til de gamle og døde træer. Nogle er almindelige, mens andre er sjældne, men alle er de eksempler på, hvilket fantastisk mylder af liv man kan møde, hvis man passer på de gamle træer, og lader dem stå for eftertiden.