

Planter

4. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 41

I de tidligt såede marker i milde områder er der fundet mindst 2 procent planter med bladlus i 18 af 29 hvedemarker (op til 12 procent angrebne planter) og i 11 af 20 vinterbygmarker (op til 14 procent angrebne planter). Der er fundet flest bladlus i Sydøstjylland. I flere marker er der således mange bladlus.

Analyse | 06. oktober 2020



Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Der er i den forløbne uge igen sket en stigning i forekomsten af bladlus.

I vinterhvede er der fundet bladlus på 22 af 29 lokaliteter (0,02-12,0 procent angrebne planter). I 18 af de 29 marker er fundet mindst 2 procent angrebne planter.

I vinterbyg er fundet bladlus på 19 af 20 lokaliteter (0,01-14,0 procent angrebne planter). I 11 af de 20 marker er fundet mindst 2 procent angrebne planter.

Der er fundet flest bladlus i Sydøstjylland.

I mange tidligt såede marker er der således fundet mange bladlus, så det er derfor meget vigtigt nu at undersøge markerne for evt. angreb.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.


Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg Lamdex/Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac eller 0,05-0,1 l Mavrik Vita pr. ha.

I vinterbyg har Biscaya OD en mindre anvendelse, og 0,1-0,15 l pr. ha anbefales. Bemærk, at det er forbudt at anvende og opbevare Biscaya OD pr. 31/12 2020.


Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

I figur 1-2 er udviklingen pt. sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at der pt. er fundet de 3. højeste angreb indenfor de sidste 8 år.





Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i vinterhvede i efteråret 2020 i forhold til tidligere år.



Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i vinterbyg i efteråret 2020 i forhold til tidligere år.

Se data og yderligere kommentarer i Registreringsnettet.

Se alle ugekommentarer til udviklingen af skadevoldere

Emneord

Registreringsnet/varsling

Skadedyr, planter

Skadedyrsbekæmpelse

+3

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

Promilleafgiftsfonden
for landbrug



SEGES Tlf. 87 40 50 00
Agro Food Park 15 Fax. 87 40 50 10
8200 Aarhus N Email info@seges.dk

