

Planter

Opgørelse af angreb af bladribbesnudebillelarver i registreringsnettet 2020

Der blev fundet angreb i de fleste marker, men overvejende svage til moderate angreb. Der blev fanget relativ få bladribbesnudebiller i de gule fangbakker.

Analyse | 09. juli 2020



Forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps er igen i år fulgt i registreringsnettet fra primo marts til ultimo april via gule fangbakker på 33 lokaliteter.

Medio til ultimo maj er angrebsgraden af bladribbesnudebillelarver opgjort. Der er udtaget i alt 20 planter i de ubehandlede områder, hvor fangbakker har været placeret. Her er stænglerne flækket og undersøgt for bladribbesnudebillelarver. Se billeder nedenfor. Procent angrebne stængler er bedømt. For de angrebne stængler er yderligere bedømt antal larver pr. stængel.

Hvis der er udført en bekæmpelse, er angrebene også bedømt i et behandlet område. Angrebsgraderne ses i tabel 1 for de lokaliteter, hvor der er bedømt angreb. Bemærk, at antal larver pr. stængel er angivet ud fra forekomsten i de angrebne stængler og ikke som et gennemsnit af forekomsten i alle stængler. Hvis der kun er angivet en værdi ved ubehandlet, er denne lokalitet ikke blevet behandlet.

Ved en enkelt lokalitet blev der kun fundet spor efter larven og derfor er angivet "kun symptomer" i tabellen.



Billede 1. Bladribbesnudebillelarve fotograferet 27. maj 2020 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Larven er lemmeløs, har brunt hoved og ligger tit i c-form. Den er 4 mm i udvokset tilstand.



Billede 2. Spor efter bladribbesnudebillens larve fotograferet den 28. maj 2020 af Mathias Vest Weber, Sønderjysk Landboforening.

Den vejledende bekæmpelsestærskel, som er 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, blev kun overskredet på en enkelt af de viste lokaliteter i tabel 1 nemlig ved Stenlille. Her er der fundet op til 10 larver pr. stængel i angrebne stængler.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

På de øvrige lokaliteter er der fundet 0 til 6 larver i stængler med angreb, og i de fleste tilfælde er der kun fundet relativ få larver pr. stængel. Angreb på 1 til 2 larver pr. stængel tillægges kun mindre betydning.

Det kølige vejr i foråret vurderes at have hæmmet æglægningen. Der er dog fundet lidt mere angreb end forventet ud fra de relative lave fangster de fleste steder.

Læs også: [Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps](#)

Tabel 1.

Center/lokalitet	Maks. antal bladribbesnudebiller pr. fangbakke pr. uge	Pct. angrebne stængler, bladribbesnudebillelarver		Larver pr. angreben stængel, ubehandlet
		Ubehandlet	Behandlet	
Djursland Landboforening				
 Fausing	0	10		1 til 2

Center/lokalitet	Maks. antal bladribbesnudebiller pr. fangbakke pr. uge	Pct. angrebne stængler, bladribbesnudebillelarver		Larver pr. angreben stængel, ubehandlet
		Ubehandlet	Behandlet	
Rønde	1	10		1
Kolding Herreds Landbrugsforening				
Seest Østerskov	0	0	5	0
Tårup	0	0	0	0
Landbrugsrådgivning Syd				
Gånsager	0	20	10	2 til 3
Tønder Øst	0	5		1
Lemvigegnens Landboforening				
Kabbel, Lemvig	3	30		1
SAGRO				
Varde Syd	0	0		0
Sønderjysk Landboforening				
Styding	0	15		1 til 2
Aarøsund	0	7		1 til 2
Velas				
Bjerring Hede	2	30		1 til 2
Kosterslev	0	68		1 til 3
Nr. Aldum	0	0		0
Søndersø	2	45		1 til 3
Vigerslev	1	60	45	Kun symptomer
VKST				
Lungholm	0	5	0	1 til 2
Nakskov	0	50		4 til 6



Center/lokalitet	Maks. antal bladribbesnudebiller pr. fangbakke pr. uge	Pct. angrebne stængler, bladribbesnudebillelarver		Larver pr. angreben stængel, ubehandlet
		Ubehandlet	Behandlet	
Soderup	7	65		1
Stenlille	19	40		1 til 10
Ugerløse	1	35		1 til 3

Oversigt over de lokaliteter hvor er der indberettet larveangreb i maj og fangster af bladribbesnudebiller i gule fangbakker i registreringsnettet i 2020. Larveangrebene er kun bedømt på angrebne stængler.

Læs også: [Opgørelse af angreb af bladribbesnudebillelarver i registreringsnettet 2019](#)

Emneord

[Kemisk bekæmpelse](#)

[Registreringsnet/varsling](#)

[Vinterraps](#)

[+1](#)

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439



Stine Styrup Bang

Konsulent

SEGES

stba@seges.dk

23474205

Støttet af

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug



SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

