

Planter

3. registrering af rapsjordløpper i raps i uge 37

Der er sket en stigning i aktiviteten i den forløbne uge, men pt. er der stadig relativ få rapsjordløpper i fangbakkerne på de fleste lokaliteter. Fangsterne i fangbakkerne siger ikke noget om behovet for at bekæmpe bladgnav.

Analyse | 08. september 2020



Forekomsten af rapsjordløpper følges igen i år via gule fangbakker på ca. 60 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppers larver. Forekomsten følges via fangbakker, fordi der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Bekæmpelse rettet mod bladgnav

Fangsterne i de gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordløpper i fremspiringsfasen. Der benyttes nu kun bejdsemidler med svag effekt, så man skal være meget opmærksom på evt. bladgnav. Bekæmpelse rettet mod bladgnav anbefales ved 5 procent bortgnavet bladareal frem til ca. 4 løvbladstadiet.

Bekæmpelse rettet mod larveangreb


Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordløpper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Der er sket en stigning i aktiviteten i den forløbne uge, men pt. er der stadig relativ få rapsjordløpper i fangbakkerne på de fleste lokaliteter. Tærsklen på 25 rapsjordløpper indenfor 3 uger er pt. kun nået på 3 af 62 lokaliteter.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og kan stadig vente lidt endnu. Der er relativ stor fleksibilitet i bekæmpelsestidspunktet rettet mod larverne.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2015-2020. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Der er i flere tilfælde også meldt om angreb af kålbladhvepselarver, som kan æde ret voldsomt af bladene. De er 1-2 cm lange og sorte eller mørkegrønne. Der er også modtaget meldinger om snegleangreb. Se yderligere i plantenytt om kålbladhvepse og snegle på LandbrugsInfo.

[Se registreringer i Registreringsnettet.](#)

[Se alle ugekommentarer for rapsjordlopper i raps](#)

Emneord

Raps

Registreringsnet/varsling

Skadedyr, planter

+1

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af



Promilleafgiftsfonden
for landbrug

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

