



REGISTRERING AF SKADEGØRERE I MAJS OG KARTOFLER I UGE 29

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Svampebekæmpelse i majs er pt. ikke aktuel.

BLADSVAMPE I MAJS

2. registrering af bladsvampe i majs er foretaget.

Der bedømmes i 14 pløjede og 7 upløjede marker, og alle marker har forfrugt majs. Majsøjeplet og majsbladplet overlever på planterester af majs, og der er derfor mere smitstof ved pløjefri dyrkning og samtidig forfrugt majs.

Der er bedømt procent angrebne planter. Der er fundet angreb af majsøjeplet i 3 af 6 upløjede marker (75, 80 og 100 procent angrebne planter). Der er fundet angreb af majsøjeplet i 4 af 13 pløjede marker (1, 10, 20 og 70 procent angrebne planter). Der er ikke registreret majsbladplet.

Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. Derudover bedømmes procent dækning på bladet, der støtter kolben samt dækning på de 2 blade under hhv. 2 blade over kolben. Disse bedømmelser giver et mere retvisende billede af angrebene end procent angrebne planter. Kun en enkelt mark er så fremskreden i udviklingen, at dette er bedømt i denne uge.

Bekæmpelse er pt. ikke aktuel.

Evt. bekæmpelse anbefales i pløjede marker ved over 60 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. De skal samtidig have været mindst én risikoperiode (mindst 36 sammenhængende timer med bladflugt) for at udløse bekæmpelse. I upløjede marker er risikoen for angreb større og bekæmpelsestærsklen derfor lavere. Tærsklen er ikke kendt, så

bekæmpelse anbefales ved begyndende angreb på bladet, der støtter kolben.

Vækststadierne varierer fra 31 til 51 (hanblomsterstand mærkbar).

CIKADER I KARTOFLER

7. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne er fra uge 28 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.

Fokus er nu rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne i stivelseskartofler. Der er fundet cikadenymfer på 10 af 14 lokaliteter med i gennemsnit 0,1 til 4 nymfer pr. blad. Ved en hurtig stigning og udbredt forekomst af cikadenymfer på undersiden af de nedre blade behandles med 0,25 kg Mospilan pr. ha. Bekæmpelse kan blive aktuel i den kommende uge 30.

MAJSHALVMØL

Der blev primo juni udstationeret feromonfælder i 17 majsmarker for at følge forekomsten af majshalvmøl, som er et relativt nyt skadedyr i Danmark. Forekomsten følges til primo august. Formålet er ikke at vurdere bekæmpelsesbehovet, men at vurdere om skadedyret breder sig.

5. aflæsning af fangster i fælderne er nu foretaget. Fangsterne er fra uge 28 og de første dage i indeværende uge. Der er den forløbne uge registreret majshalvmøl (1-2 pr. fælde) på 5 af 13 lokaliteter nemlig ved Løgumkloster (2 tilfælde), Bramming og Ribe samt på Bornholm.

Se de detaljerede registreringer i alle ovennævnte afgrøder på siden [varsling/registreringsnet](#).