



## REGISTRERING AF SKADEGØRERE I KORN, ROER, KARTOFLER OG MAJS I UGE 27

STØTTET AF

### Promilleafgiftsfonden for landbrug

Angrebene af bladlus i hvede, vårbyg og havre er fortsat svage, og bekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de fleste marker.

- [Vinterhvede](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Skadedyr i sukkerroer](#)
- [Cikader i kartofler](#)
- [Majshalvmøl](#)

## VINTERHVEDE

Hveden er nu så fremskreden i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere er aktuel. Det gennemsnitlige vækststadiet er 75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner i fuld størrelse).

Brunrust: Angrebene har bredt sig lidt i ugens løb. Der er nu fundet brunrust i ca. 20 procent af de ubehandlede observationerne mod 10 procent ugen før. Mest er fundet i KWS Lili, Kvium og Torp, hvor der er op til 100 procent angrebne planter.

Gulrust: Ses på procent dækning af gulrust på 2. øverste blad i ubehandlede marker er fundet mest i Benchmark efterfulgt af Drachmann, hvor ca. 70 procent hhv. ca. 25 procent af markerne har over 10 procent dækning af gulrust på det 2. øverste blad. Ingen af de øvrige sorter har over 10 procent dækning på det 2. øverste blad. Næstmest er fundet i Sheriff, KWS Lili og Torp, hvor 21 procent, 11 procent hhv. 11 procent af de ubehandlede marker har 1-10 procent

dækning på 2. øverste blad.

Mindst er fundet i Informer, Chevignon og Graham, hvor der er under 1 procent dækning af gulrust på 2. øverste blad i alle ubehandlede marker. KWS Extase og Kvium har haft en anelse mere, men har også forholdsvis lidt gulrust.

**Septoria:** Angrebene af Septoria har bredt sig lidt i den forløbne uge, men angrebene er fortsat overvejende svage. Mange steder har der været nedbør i perioden 4.-6. juni, og disse angreb er nu blevet synlige.

Se også sygdomsbedømmelser i hvede i observationsparcellerne her:

<https://www.tystofte.dk/resultater/observationsparceller/2020-2/>

**Bladlus:** Angrebene ligger på samme niveau som ugen før og er fortsat overvejende svage. Der er fundet op til 25 procent angrebne strå.


Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus i vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet) er 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Evt. skadedyrsbekæmpelse er nu ikke længere aktuel i mange marker.


[Til top](#)

*Dette var sidste bedømmelse i hvede i år. Vi takker for indberetningerne.*




**Foto 1.** Angrebene af brunrust har i år været svage og er kommet meget sent både i rug og hvede.





**Figur 1.** Udviklingen af brunrust i hvede i 2020 i forhold til de to foregående år. Kurven dykker i 2019 i uge 28, fordi registreringerne er ophørt, men ganske få har fortsat registreret.



**Figur 2.** Udviklingen af Septoria i hvede i 2020 i forhold til de to foregående år. Kurven dykker i 2019 i uge 28, fordi registreringerne er ophørt, men ganske få har fortsat registreret.

Til top

## VÅRBYG

Vårbyggen er nu så fremskreden i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere er aktuell. Det gennemsnitlige vækststadium er 74 (tæt på kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse).

Der kan være enkelte meget sentsåede marker, hvor bekæmpelse frem til vækststadium 65 (blomstring halvvejs) kan være aktuell ved overskridelse af bekæmpelsestærsklerne.

Skoldplet er fortsat mest udbredt, men angrebene af bygrust og bygbladplet har også bredt sig i den forløbne uge. Der er mest skoldplet i Ellinor og RGT Planet og mest bygbladplet i RGT Planet og meget bygrust i flere sorter.

Der er begyndende angreb af Ramularia, som er fundet i ca. 10 procent af observationerne.


Se også sygdomsbedømmelser i vårbyg i observationsparcellerne her:

<https://www.tystofte.dk/resultater/observationsparceller/2020-2/>

Angrebene af bladlus er stadig svage. Der er fundet op til 15 procent strå med bladlus. Den

vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus i vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet) er 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Evt. skadedyrsbekæmpelse er nu ikke længere aktuel i mange marker.

*Dette var sidste bedømmelse i vårbyg i år. Vi takker for indberetningerne.*



**Figur 3.** Udviklingen af bygrust i vårbyg i 2020 i forhold til de to foregående år.

[Til top](#)

## HAVRE

Havren er nu så fremskreden i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere er aktuel. Det gennemsnitlige vækststadium er 72 (tæt på tidlig mælkemodent stadium).

Der kan være enkelte meget sentsåede marker, hvor bekæmpelse frem til vækststadium 65 (blomstring halvvejs) kan være aktuel. Meldug anbefales bekæmpet til vækststadium 65 (blomstring halvvejs) ved over 75 procent angrebne planter.

Angrebene af meldug har igen bredt sig noget i den forløbne uge. Mindst meldug er fundet i Delfin.

Se også sygdomsbedømmelser i havre i observationsparcellerne her:

<https://www.tystofte.dk/resultater/observationsparceller/2020-2/>

Angrebene af bladlus er fortsat svage. Der er fundet op til 5 procent strå med bladlus. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus i vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet) er 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Evt. skadedyrsbekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de mange marker.

I havre foretages et begrænset antal registreringer.

[Til top](#)

*Dette var sidste bedømmelse i havre i år. Vi takker for indberetningerne.*

# SKADEDYR I SUKKERROER

NBR Nordic Beet Research og Nordic Sugar Agricenter følger ugentlig udviklingen af skadedyr i sukkerroer bejdsset med Force i 13 marker fordelt i områderne Lolland, Falster, Møn, Vest- og Sydsjælland.

Generelt anses bladlus kun for et evt. problem i Force-bejdsede marker.

De sorte bedebbladlus findes kun med forholdsvis lille forekomst og oftest mest i kanterne af markerne. Bekæmpelsestærsklen er over 50 procent planter med kolonidannelse.

Ferskenbladlus, som for det meste sidder enkeltvist på bagsiden af de store roeblade, er fundet i varierende omfang. Bekæmpelsestærsklen er fund af mere end en bladlus pr. plante. I området Sydøstlolland (Nysted - Holeby) er fundet en del marker med behov for bekæmpelse. I det øvrige dyrkningsområde er der også konstateret ferskenbladlus, men i langt de fleste marker under bekæmpelsestærsklen.

Det er derfor vigtigt at følge forekomst og udvikling af ferskenbladlus i egne marker.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,25 kg Pirimor, 0,14 kg Teppeki eller 0,75 l Movento pr. ha. Sidstnævnte to midler har fået en mindre anvendelse mod bladlus i roer. Pirimor og Teppeki må kun anvendes en gang pr. sæson og Movento 2 gange pr. sæson. Pirimor eller Teppeki er mest relevante grundet den laveste pris. Pirimor er mest krævende mht. gode sprøjteforhold (lunt og stille vejr).

Enkelte steder kan langs hegn ses angreb i kanten af marken af bladtæger, som giver gule bladspidser og krusede blade. Ved kraftige angreb kan en randbehandling med Lamdex/Karate være aktuel.

Siden opdateres hver onsdag.

[Til top](#)

# CIKADER I KARTOFLER

5. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne er fra uge 26 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.

Der findes fortsat cikader på alle lokaliteter og op til i gennemsnit 26-31 pr. limplade. Første bekæmpelse foretages tre til fire uger efter begyndende indflyvning, som var i uge 21. Bekæmpelse var således aktuel i uge 24 i de længst udviklede marker og i uge 25 i de øvrige marker, da der skal være noget bladmasse til at optage sprøjtemiddel. Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Til bekæmpelse er anbefalet 0,15 kg Mospilan.

Fra den kommende uge 28 optælles cikadenymfer på bladenes underside.

# MAJSHALVMØL

Der blev i uge 24 udstationeret feromonfælder i 17 majsmarker for at følge forekomsten af majshalvmøl, som er et relativt nyt skadedyr i Danmark. Formålet er ikke at vurdere bekæmpelsesbehovet, men at vurdere om skadedyret breder sig.

3. aflæsning af fangster i fælderne er nu foretaget. Der er fundet 2, 1 og 1 majshalvmøl ved Lemvig hhv. 2 marker ved Løgumkloster.



**Foto 2.** Majshalvmøl på klisterbund i feromonfælde.

Se de detaljerede registreringer i alle ovennævnte afgrøder på siden [varsling/registreringsnet](#).

[Til top](#)